

脳神経外科

2023年8月 審査分

癌種	剤型	レジメン名/薬剤	投与量	投与日/1コース日数	備考
MSI-High固形癌					
	◆	キイトルーダ6週毎(MSI-High固形癌)		1コース 42日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1	
	◆	キイトルーダ療法(MSI-High固形癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1	
TMB-High固形癌					
	◆	キイトルーダ3週ごと(化学療法後増悪TMB-High固形癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1	
	◆	キイトルーダ6週ごと(化学療法後増悪TMB-High固形癌)		1コース 42日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1	
悪性神経膠腫					
	◆	ACNU維持治療(悪性神経膠腫)		1コース 56日	□術前: ■術後:主治医判断 ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ニムスチン塩酸塩注射用	80 mg/m ²	day 1	
	◆	AVASTIN(維持療法)(悪性神経膠腫)		1コース 14日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ペバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	10 mg/kg	day 1	
	◆	AVASTIN+テモダール(悪性神経膠腫)		1コース 28日	■術前:主治医判断 ■術後:主治医判断 ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ペバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	10 mg/kg	day 1,15	
	【内服】	テモゾロミド	150-200 mg/m ²	day 2-6	起床時服用
	◆	PAV(悪性神経膠腫)		1コース 56日	□術前: ■術後:最大8コース ■進行再発:最大8コース □その他:
	【静注】	ニムスチン塩酸塩注射用	70 mg/m ²	day 1	
	【静注】	ピンクリスチン硫酸塩注射用	1.4 mg/m ²	day 8,29	Max 2mg/body
	【内服】	塩酸プロカルバジン	60 mg/m ²	day 8-21	2~3回で分割投与、50mg刻みで端数切捨て
視神経・視床下部神経膠腫					
	◆	カルボ・ピンクリスチン維持療法(視神経・視床下部神経膠腫)		1コース 42日	□術前: ■術後:8コース ■進行再発:8コース ■その他:8コース
	【静注】	カルボプラチン注射液	175 mg/m ²	day 1,8,15,22	
	【静注】	ピンクリスチン硫酸塩注射用	1.5 mg/m ²	day 1,8,15	Max 2mg/body
	◆	カルボ・ピンクリスチン導入療法(視神経・視床下部神経膠腫)		1コース 84日	□術前: ■術後:1コース ■進行再発:1コース ■その他:1コース
	【静注】	カルボプラチン注射液	175 mg/m ²	day 1,8,15,22,43,50,57,64	
	【静注】	ピンクリスチン硫酸塩注射用	1.5 mg/m ²	day 1,8,15,22,29,36,43,50,57,64	Max 2mg/body
脳悪性リンパ腫					
	◆	MPV(初発or未照射再発脳悪性リンパ腫)		1コース 21日(初発)、3~4ヵ月(再発)	□術前: □術後: ■進行再発:5コース ■その他:5コース
	【静注】	ピンクリスチン硫酸塩注射用	1.4 mg/m ²	day 1	Max 2mg/body
	【静注】	ホリナートカルシウム	15 mg/body	day 11-15	
	【静注】	メトトレキサート注射用	3500 mg/m ²	day 10	※2-5コースはMTX単独4コース
	【内服】	塩酸プロカルバジン	100 mg/m ²	day 2-8	2~3回で分割投与、50mg刻みで端数切捨て
	◆	MPV療法(維持)(脳悪性リンパ腫)		1コース 3~4ヵ月	□術前: □術後: □進行再発: ■その他:5コース
	【静注】	ピンクリスチン硫酸塩注射用	1.4 mg/m ²	day 1	Max 2mg/body
	【静注】	ホリナートカルシウム	15 mg/body	day 11-15	
	【静注】	メトトレキサート注射用	3500 mg/m ²	day 10	
	【内服】	塩酸プロカルバジン	100 mg/m ²	day 2-8	2~3回で分割投与、50mg刻みで端数切捨て
	◆	R-MPV(維持)(再発脳悪性リンパ腫)		1コース 3~4ヵ月	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ピンクリスチン硫酸塩注射用	1.4 mg/m ²	day 1	Max 2mg/body
	【静注】	ホリナートカルシウム	15 mg/body	day 11-15	
	【静注】	メトトレキサート注射用	3500 mg/m ²	day 10	
	【静注】	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	375 mg/m ²	day 9	
	【内服】	塩酸プロカルバジン	100 mg/m ²	day 2-8	2~3回で分割投与、50mg刻みで端数切捨て
	◆	weekly rituximab(脳悪性リンパ腫)		1コース 56日	□術前: □術後: ■進行再発:1コース □その他:
	【静注】	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	375 mg/m ²	day 1,8,15,22,29,36,43,50	