

## 皮膚科

2023年8月 審査分

癌種	剤型	レジメン名/薬剤	投与量	投与日/1コース日数	備考
<b>MSI-High固形癌</b>					
	◆	キイトルーダ6週毎(MSI-High固形癌)		1コース 42日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1	
	◆	キイトルーダ療法(MSI-High固形癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1	
<b>TMB-High固形癌</b>					
	◆	キイトルーダ 3週ごと(化学療法後増悪TMB-High固形癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1	
	◆	キイトルーダ 6週ごと(化学療法後増悪TMB-High固形癌)		1コース 42日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1	
<b>メルケル細胞癌</b>					
	◆	バベンチオ療法(メルケル細胞癌)		1コース 14日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	アベルマブ(遺伝子組換え)注射液	10 mg/kg	day 1	
<b>悪性黒色腫</b>					
	◆	オブジーボ+ヤーボイ併用療法(悪性黒色腫)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:4コース □その他:
	【静注】	イピリムマブ(遺伝子組換え)注射液	3 mg/kg	day 1	
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	80 mg/body	day 1	
	◆	オブジーボ4週毎(悪性黒色腫)		1コース 28日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	day 1	
	◆	オブジーボ4週毎(術後)(悪性黒色腫)		1コース 28日	□術前: ■術後:1年間 □進行再発: □その他:
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	day 1	
	◆	オブジーボ療法(悪性黒色腫)		1コース 14日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1	
	◆	オブジーボ療法(術後)(悪性黒色腫)		1コース 14日	□術前: ■術後:1年間 □進行再発: □その他:
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1	
	◆	キイトルーダ3週毎 術後補助(悪性黒色腫)		1コース 21日	□術前: ■術後:1年間 □進行再発: □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1	
	◆	キイトルーダ6週毎 術後補助(悪性黒色腫)		1コース 42日	□術前: ■術後:1年間 □進行再発: □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1	
	◆	キイトルーダ6週毎(悪性黒色腫)		1コース 42日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1	
	◆	キイトルーダ療法(悪性黒色腫)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1	
	◆	ヤーボイ療法(悪性黒色腫)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:4コース □その他:
	【静注】	イピリムマブ(遺伝子組換え)注射液	3 mg/kg	day 1	
<b>乳房外Paget病</b>					
	◆	ドセタキセル(乳房外Paget病)		1コース 28日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ドセタキセル注射液	60 mg/m <sup>2</sup>	day 1	
	◆	ハーセプチン+PTX療法(乳房外Paget病)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	トラスツマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg
	【静注】	パクリタキセル注射液	175 mg/m <sup>2</sup>	day 1	
<b>皮膚リンパ腫</b>					
	◆	CHOP(菌状息肉腫)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	シクロホスファミド水和物注射用	750 mg/m <sup>2</sup>	day 1	
	【静注】	ドキシソリン塩酸塩注射用	50 mg/m <sup>2</sup>	day 1	
	【静注】	ビンクリスチン硫酸塩注射用	1.4 mg/m <sup>2</sup>	day 1	Max 2mg/body
	【内服】	ブレドニゾロン	100 mg/body	day 1-5	
	◆	アドセトリス単剤療法(未分化大細胞リンパ腫)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:~16コース □その他:
	【静注】	ブレントキシマブ ヘドチン(遺伝子組換え)注射用	1.8 mg/kg	day 1	
	◆	ポテリジオ1~4コース目(皮膚T細胞リンパ腫)		1コース 7日	□術前: □術後: ■進行再発:4コース ■その他:4コース
	【静注】	モガムリスマブ(遺伝子組換え)注射液	1 mg/kg	day 1	
	◆	ポテリジオ5コース目以降(皮膚T細胞リンパ腫)		1コース 14日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 ■その他:主治医判断
	【静注】	モガムリスマブ(遺伝子組換え)注射液	1 mg/kg	day 1	