

耳鼻咽喉・頭頸部外科

2023年8月 審査分

癌種	剤型	レジメン名/薬剤	投与量	投与日/1コース日数	備考
MSI-High固形癌					
	◆	キイトルーダ6週毎 (MSI-High固形癌)		1コース 42日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1	
	◆	キイトルーダ療法 (MSI-High固形癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1	
TMB-High固形癌					
	◆	キイトルーダ 6週ごと(化学療法後増悪TMB-High固形癌)		1コース 42日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1	
悪性黒色腫					
	◆	オブジーボ・ヤーボイ併用療法 (悪性黒色腫)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:4コース □その他:
	【静注】	イピリムマブ(遺伝子組換え)注射液	3 mg/kg	day 1	
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	80 mg/body	day 1	
	◆	オブジーボ4週毎(悪性黒色腫)		1コース 28日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	day 1	
	◆	オブジーボ4週毎(術後)(悪性黒色腫)		1コース 28日	□術前: ■術後:1年間 □進行再発: □その他:
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	day 1	
	◆	オブジーボ療法 (悪性黒色腫)		1コース 14日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1	
	◆	オブジーボ療法 (術後) (悪性黒色腫)		1コース 14日	□術前: ■術後:1年間 □進行再発: □その他:
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1	
	◆	キイトルーダ6週毎 (悪性黒色腫)		1コース 42日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1	
	◆	キイトルーダ療法 (悪性黒色腫)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1	
	◆	ヤーボイ療法 (悪性黒色腫)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:4コース □その他:
	【静注】	イピリムマブ(遺伝子組換え)注射液	3 mg/kg	day 1	
唾液腺癌					
	◆	HER+DOC(唾液腺癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:PDまで □その他:
	【静注】	ドセタキセル注射液	70 mg/m ²	day 1	
	【静注】	トラストズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg
	◆	HER単剤(唾液腺癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:PDまで □その他:
	【静注】	トラストズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg
頭頸部癌					
	◆	Cetuximab+PTX (頭頸部癌)		1コース 7日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250-400 mg/m ²	day 1	初回量: 400mg/m ² 、維持量: 250mg/m ²
	【静注】	パクリタキセル注射液	80 mg/m ²	day 1	
	◆	Cmab+CBDCA+5-FU療法(頭頸部癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:6コース □その他:
	【静注】	カルボプラチン注射液	AUC 5	day 1	
	【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250-400 mg/m ²	day 1,8,15	初回量: 400mg/m ² 、維持量: 250mg/m ²
	【静注】	フルオロウラシル注射液	800 mg/m ²	day 1-4	
	◆	Cmab+CDDP+5-FU療法(頭頸部癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:6コース □その他:
	【静注】	シスプラチン注射液	80 mg/m ²	day 1	
	【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250-400 mg/m ²	day 1,8,15	初回量: 400mg/m ² 、維持量: 250mg/m ²
	【静注】	フルオロウラシル注射液	800 mg/m ²	day 1-4	
	◆	Pembro単剤(頭頸部癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:PDまで ■その他:PDまで
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1	
	◆	PTX+CBDCA+Cmab (頭頸部癌)		1コース 21日	■術前:1-2コース □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	カルボプラチン注射液	AUC 2	day 1,8	
	【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250-400 mg/m ²	day 1,8,15	初回量: 400mg/m ² 、維持量: 250mg/m ²
	【静注】	パクリタキセル注射液	100 mg/m ²	day 1,8	
	◆	PTX単独 (頭頸部癌)		1コース 56日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	パクリタキセル注射液	100 mg/m ²	day 1,8,15,22,29,36	
	◆	weekly Cmab (頭頸部癌)		1コース 7日	□術前: □術後: ■進行再発:PDまで □その他:
	【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250 mg/m ²	day 1	
	◆	オブジーボ4週毎(頭頸部癌)		1コース 28日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	day 1	
	◆	オブジーボ療法 (頭頸部癌)		1コース 14日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1	
	◆	キイトルーダ6週毎 (頭頸部癌)		1コース 42日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1	
	◆	ドセタキセル単剤療法(頭頸部癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:

【静注】ドセタキセル注射液

60 mg/m²

day 1