

泌尿器科

2023年8月 審査分

癌種	剤型	レジメン名/薬剤	投与量	投与日/1コース日数	備考
MSI-High固形癌					
	◆	キイトルーダ6週毎 (MSI-High固形癌)		1コース 42日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1	
	◆	キイトルーダ6週毎+ミトタン (MSI-High副腎癌)		1コース 42日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1	
	【内服】	オペブリム	1500-4500 mg/body	day 1-42	分3
	◆	キイトルーダ療法 (MSI-High固形癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1	
	◆	ベムプロリスマブ+ミトタン併用療法 (MSI-High副腎癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1	
	【内服】	オペブリム	1500-4500 mg/body	day 1-21	分3
TMB-High固形癌					
	◆	キイトルーダ 3週ごと(化学療法後増悪TMB-High固形癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1	
	◆	キイトルーダ 6週ごと(化学療法後増悪TMB-High固形癌)		1コース 42日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1		
その他					
	◆	アドリアシン単剤療法(後腹膜肉腫)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ドキシソリン塩酸塩注射液	75 mg/m ²	day 1	
	◆	ハラヴェン(後腹膜肉腫)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	エリブリンメシル酸塩注射液	1.4 mg/m ²	day 1,8		
腎細胞癌					
	◆	アベルマブ、アキシチニブ併用療法(進行性腎細胞癌)		1コース 14日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	アベルマブ(遺伝子組換え)注射液	10 mg/kg	day 1	
	【内服】	アキシチニブ	4-20 mg/body	day 1-14	分2
	◆	イピリムマブ+ニボルマブ療法(腎細胞癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:4コース □その他:
	【静注】	イピリムマブ(遺伝子組換え)注射液	1 mg/kg	day 1	
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1	
	◆	オプジーボ4週毎(腎癌)		1コース 28日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	day 1	
	◆	キイトルーダ6週毎+アキシチニブ(腎癌)		1コース 42日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1	
	【内服】	アキシチニブ	10-20 mg/body	day 1-42	朝夕食後
	◆	トーリセル療法(腎細胞癌)		1コース 7日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	テムシロリムス注射液	25 mg/body	day 1	
	◆	ニボルマブ(2週)+カボザンチニブ(腎癌)		1コース 14日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1	
	【内服】	カボザンチニブ	40 mg/body	day1-14	分1 空腹時
	◆	ニボルマブ(4週)+カボザンチニブ(腎癌)		1コース 28日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	day 1	
	【内服】	カボザンチニブ	40 mg/body	day1-28	分1 空腹時
	◆	ニボルマブ(腎癌)		1コース 14日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1		
◆	ベムプロリスマブ+アキシチニブ(腎癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:	
【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1		
【内服】	アキシチニブ	10-20 mg/body	day 1-21	朝夕食後	
◆	レンパチニブ+ベムプロリスマブ(腎癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:	
【静注】	ベムプロリスマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1		
【内服】	レンパチニブ	20 mg/body	day1-21	分1	
前立腺癌					
	◆	カバジタキセル療法(前立腺癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	カバジタキセル アセトン付加物注射液	25 mg/m ²	day 1	
	◆	ドセタキセル療法(前立腺癌)		1コース 21-28日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ドセタキセル注射液	70 mg/m ²	day 1		
尿路上皮癌					
	◆	GEM+CBDDCA(尿路上皮癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:
	【静注】	カルボプラチン注射液	AUC 5	day 1	
	【静注】	ゲムシタピン塩酸塩注射液	1000 mg/m ²	day 1,8	
	◆	GEM+CDDP療法(3weeks)(尿路上皮癌)		1コース 21日	■術前:3~6コース □術後: ■進行再発:3~6コース □その他:
	【静注】	ゲムシタピン塩酸塩注射液	1000 mg/m ²	day 1,8	
【静注】	シスプラチン注射液	70 mg/m ²	day 2		

◆	GEM+CDDP療法(尿路上皮癌)		1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射液	1000 mg/m ²	day 1,8,15				
【静注】	シスプラチン注射液	70 mg/m ²	day 2				
◆	GEM+CDDP療法(尿路上皮癌)(術前)		1コース 28日	■術前:主治医判断	□術後:	□進行再発:	□その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射液	1000 mg/m ²	day 1,8,15				
【静注】	シスプラチン注射液	70 mg/m ²	day 2				
◆	アベルマブ化学療法後維持療法(尿路上皮癌)		1コース 14日	□術前:	□術後:	□進行再発:	■その他:主治医判断
【静注】	アベルマブ(遺伝子組換え)注射液	10 mg/kg	day 1				
◆	エンホルツマブ ベドチン(尿路上皮癌)		1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)注	1.25 mg/kg	day 1,8,15	MAX 125mg/body			
◆	キイトルーダ6週毎(尿路上皮癌)		1コース 42日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1				
◆	ゲムシタビン(尿路上皮癌)		1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射液	1000 mg/m ²	day 1,8,15				
◆	ドセタキセル療法(尿路上皮癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	ドセタキセル注射液	70 mg/m ²	day 1				
◆	ニボルマブ術後補助(2週)(尿路上皮癌)		1コース 14日	□術前:	■術後:12か月間	□進行再発:	□その他:
【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1				
◆	ニボルマブ術後補助(4週)(尿路上皮癌)		1コース 28日	□術前:	■術後:12か月間	□進行再発:	□その他:
【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	day 1				
◆	ペムブロリズマブ(尿路上皮癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1				