

耳鼻咽喉・頭頸部外科

2021年7月 審査分

癌種	剤型	レジメン名/薬剤	投与量	投与日/1コース日数	備考			
MSI-High固形癌								
	◆	キイトルーダ6週毎(MSI-High固形癌)		1コース 42日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	【静注】	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1				
	◆	キイトルーダ療法(MSI-High固形癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	【静注】	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1				
悪性黒色腫								
	◆	オブジーボ・ヤーボイ併用療法(悪性黒色腫)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:4コース	□その他:
	【静注】	イビリムマブ(遺伝子組換え)注射液	3 mg/kg	day 1				
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	80 mg/body	day 1				
	◆	オブジーボ4週毎(悪性黒色腫)		1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	day 1				
	◆	オブジーボ4週毎(術後)(悪性黒色腫)		1コース 28日	□術前:	■術後:1年間	□進行再発:	□その他:
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	day 1				
	◆	オブジーボ療法(悪性黒色腫)		1コース 14日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1				
	◆	オブジーボ療法(術後)(悪性黒色腫)		1コース 14日	□術前:	■術後:1年間	□進行再発:	□その他:
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1				
	◆	キイトルーダ6週毎(悪性黒色腫)		1コース 42日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	【静注】	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1				
	◆	キイトルーダ療法(悪性黒色腫)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	【静注】	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1				
	◆	ヤーボイ療法(悪性黒色腫)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:4コース	□その他:
	【静注】	イビリムマブ(遺伝子組換え)注射液	3 mg/kg	day 1				
頭頸部癌								
	◆	CDDP+5-FU+Cetuximab(頭頸部癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:1-6コース	□その他:
	【静注】	シスプラチン注射液	80 mg/m ²	day 1				
	【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250-400 mg/m ²	day 1,8,15			初回量: 400mg/m ² 、維持量: 250mg/m ²	
	【静注】	フルオロウラシル注射液	800 mg/m ²	day 1-5				
	◆	Cetuximab+PTX(頭頸部癌)		1コース 7日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250-400 mg/m ²	day 1			初回量: 400mg/m ² 、維持量: 250mg/m ²	
	【静注】	パクリタキセル注射液	80 mg/m ²	day 1				
	◆	Pembro単剤(頭頸部癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:PDまで	■その他:PDまで
	【静注】	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1				
	◆	PTX+CBDCA+Cmab(頭頸部癌)		1コース 21日	■術前:1-2コース	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	【静注】	カルボプラチン注射液	AUC 2	day 1,8				
	【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250-400 mg/m ²	day 1,8,15			初回量: 400mg/m ² 、維持量: 250mg/m ²	
	【静注】	パクリタキセル注射液	100 mg/m ²	day 1,8				
	◆	PTX単独(頭頸部癌)		1コース 56日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	【静注】	パクリタキセル注射液	100 mg/m ²	day 1,8,15,22,29,36				
	◆	weekly Cmab(頭頸部癌)		1コース 7日	□術前:	□術後:	■進行再発:PDまで	□その他:
	【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250 mg/m ²	day 1				
	◆	オブジーボ4週毎(頭頸部癌)		1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	day 1				
	◆	オブジーボ療法(頭頸部癌)		1コース 14日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1				
	◆	キイトルーダ6週毎(頭頸部癌)		1コース 42日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	【静注】	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1				
	◆	ドセタキセル単剤療法(頭頸部癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	【静注】	ドセタキセル注射液	60 mg/m ²	day 1				