

癌種	剤型	レジメン名/薬剤	投与量	投与日/1コース日数	備考			
MSI-High 固形癌								
【静注】	◆ キイトルーダ6週毎(MSI-High 固形癌)			1コース 42日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1					
【静注】	◆ キイトルーダ療法(MSI-High 固形癌)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1					
TMB-High 固形癌								
【静注】	◆ キイトルーダ3週ごと(化学療法後増悪TMB-High 固形癌)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1					
【静注】	◆ キイトルーダ6週ごと(化学療法後増悪TMB-High 固形癌)			1コース 42日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1					
乳癌								
【静注】	◆ AC療法NK1あり(乳癌)			1コース 21日	■術前:4コース	■術後:4コース	□進行再発:	□その他:
	シクロホスフアミド水和物注射用	600 mg/m ²	day 1					
【静注】	ドキソルビシン塩酸塩注射用	60 mg/m ²	day 1					
	◆ dose=dense AC療法(乳癌)			1コース 14日	■術前:4コース	■術後:4コース	□進行再発:	□その他:
【静注】	シクロホスフアミド水和物注射用	600 mg/m ²	day 1					
	ドキソルビシン塩酸塩注射用	60 mg/m ²	day 1					
【静注】	◆ dose=dense PTX療法(乳癌)			1コース 14日	■術前:4コース	■術後:4コース	□進行再発:	□その他:
	パクリタキセル注射液	175 mg/m ²	day 1					
【静注】	◆ DTX+CBDCA+q3wHER(乳癌)			1コース 21日	■術前:6コース	■術後:6コース	□進行再発:	□その他:
	カルボプラチナ注射液	AUC 6	day 1					
【静注】	ドセタキセル注射液	75 mg/m ²	day 1					
	【静注】トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1					
【静注】	ペルツズマブ(遺伝子組換え)注射液	420-840 mg/body	day 1		初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
	◆ DTX+CBDCA+q3wHER+PER(乳癌)			1コース 21日	■術前:6コース	■術後:6コース	□進行再発:	□その他:
【静注】	カルボプラチナ注射液	AUC 6	day 1					
	ドセタキセル注射液	75 mg/m ²	day 1					
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1		初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
	ペルツズマブ(遺伝子組換え)注射液	420-840 mg/body	day 1		初回量: 840mg/body、維持量: 420mg/body			
【静注】	◆ DTX療法			1コース 21-28日	■術前:4コース	■術後:4コース	□進行再発:	□その他:
	ドセタキセル注射液	75 mg/m ²	day 1					
【静注】	◆ HER+PER+タモキシフェン(乳癌)			1コース 21日	□術前:	■術後:14コース	■進行再発:PDまで	□その他:
	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1					
【静注】	ペルツズマブ(遺伝子組換え)注射液	420-840 mg/body	day 1					
	【内服】タモキシフェン酸塩	※ mg/body	day 1-21		※添付文書通り			
【静注】	◆ weekly PTX療法(12週連投)			1コース 7日	■術前:12コース	■術後:12コース	□進行再発:	□その他:
	パクリタキセル注射液	80 mg/m ²	day 1					
【静注】	◆ weekly PTX療法(3投1休)			1コース 28日	■術前:4コース	■術後:4コース	□進行再発:	□その他:
	パクリタキセル注射液	80 mg/m ²	day 1,8,15					
【静注】	◆ wPTX+pembro(進行再発トリプルネガティブ乳癌)			1コース 84日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	パクリタキセル注射液	90 mg/m ²	day 1,8,15,29,36,43,57,64,71					
【静注】	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1,22,43,64					
	◆ wPTX+バージェタ+q3wHER(乳癌)			1コース 21日	■術前:4コース	■術後:4コース	□進行再発:	□その他:
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1		初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
	【静注】パクリタキセル注射液	80 mg/m ²	day 1,8,15					
【静注】	ペルツズマブ(遺伝子組換え)注射液	420-840 mg/body	day 1		初回量: 840mg/body、維持量: 420mg/body			
	◆ ドセタキセル+バージェタ+q3wHER(乳癌)			1コース 21日	■術前:4コース	■術後:4コース	□進行再発:	□その他:
【静注】	ドセタキセル注射液	75 mg/m ²	day 1					
	【静注】トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1		初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
【静注】	ペルツズマブ(遺伝子組換え)注射液	420-840 mg/body	day 1		初回量: 840mg/body、維持量: 420mg/body			
【静注】	◆ ドセタキセル+フェスゴ(乳癌)			1コース 21日	■術前:4コース	■術後:4コース	■進行再発:PDまで	□その他:
	ドセタキセル注射液	75 mg/m ²	day 1					
【皮下】	【皮下】ペルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)注射液	10-15 mL/body	day 1		初回導入: 15 mL/body、維持: 10 mL/body			
	◆ フェスゴ+AI(乳癌)			1コース 21日	□術前:	■術後:※下記	■進行再発:PDまで	□その他:
【皮下】	ペルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)注射液	10-15 mL/body	day 1		初回導入: 15 mL/body、維持: 10 mL/body、※周術期と合わせて1年			
	【内服】アロマターゼ阻害薬	※ mg/body	day 1-21		※添付文書通り			
【皮下】	◆ フェスゴ+タモキシフェン(乳癌)			1コース 21日	□術前:	■術後:14コース	■進行再発:PDまで	□その他:
	ペルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)注射液	10-15 mL/body	day 1		初回導入: 15 mL/body、維持: 10 mL/body			
【内服】	タモキシフェン酸塩	※ mg/body	day 1-21		※添付文書通り			
乳癌(術後)								

◆ DTX+ハーセプチン療法(術後)(乳癌)			1コース 21日	□術前:	■術後:4コース	□進行再発:	□その他:
【静注】 ドセタキセル注射液		75 mg/m ²	day 1				
【静注】 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用		6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
◆ pembrolizumab(3週毎)(術後)再発高リスクのトリプルネガティブ乳癌)		200 mg/body	day 1	1コース 21日	□術前:	■術後:9コース	□進行再発:
【静注】 ベムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液		400 mg/body	day 1	1コース 42日	□術前:	■術後:5コース	□進行再発:
◆ pembrolizumab(6週毎)(術後)再発高リスクのトリプルネガティブ乳癌)		400 mg/body	day 1	1コース 21日	□術前:	■術後:4コース	□進行再発:
【静注】 ベムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液		600 mg/m ²	day 1	1コース 21日	□術前:	■術後:4コース	□進行再発:
◆ T(DTX)C療法(術後)(乳癌)		600 mg/m ²	day 1	1コース 21日	□術前:	■術後:4コース	□進行再発:
【静注】 シクロホスファミド水和物注射用		75 mg/m ²	day 1				
【静注】 ドセタキセル注射液							
◆ TC(DTX+CPA)+ハーセプチン療法(術後)(乳癌)			1コース 21日	□術前:	■術後:4コース	□進行再発:	□その他:
【静注】 シクロホスファミド水和物注射用		600 mg/m ²	day 1				
【静注】 ドセタキセル注射液		75 mg/m ²	day 1				
【静注】 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用		6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
◆ weekly PTX12週連投+ハーセプチン療法(術後)			1コース 21日	□術前:	■術後:4コース	□進行再発:	□その他:
【静注】 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用		6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
【静注】 バクリタキセル注射液		80 mg/m ²	day 1,8,15				
◆ カドサイラ(術後)(乳癌)			1コース 21日	□術前:	■術後:14コース	□進行再発:	□その他:
【静注】 トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)注射用		3.6 mg/kg	day 1				
◆ パージェタ+q3wHER(乳癌)			1コース 21日	□術前:	■術後:1年間	□進行再発:	□その他:
【静注】 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用		6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
【静注】 ベルツスマブ(遺伝子組換え)注射液		420-840 mg/body	day 1	初回量: 840mg/body、維持量: 420mg/body			
◆ ハーセプチン/アリミダックス療法(術後)			1コース 21日	□術前:	■術後:1年間	□進行再発:	□その他:
【静注】 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用		6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
【内服】 アナストロゾール		1 mg/body	day 1-21				
分1							
◆ ハーセプチン/アロマシン療法(術後)			1コース 21日	□術前:	■術後:1年間	□進行再発:	□その他:
【静注】 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用		6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
【内服】 エキセメスタン		25 mg/body	day 1-21				
分1							
◆ ハーセプチン/ノルバデックス療法(術後)			1コース 21日	□術前:	■術後:1年間	□進行再発:	□その他:
【静注】 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用		6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
【内服】 タモキシフェンクエン酸塩		20 mg/body	day 1-21				
分1							
◆ ハーセプチン/フェマーラ療法(術後)			1コース 21日	□術前:	■術後:1年間	□進行再発:	□その他:
【静注】 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用		6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
【内服】 レトロゾール		2.5 mg/body	day 1-21				
分1							
◆ ハーセプチン療法(術後)			1コース 21日	□術前:	■術後:1年間	□進行再発:	□その他:
【静注】 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用		6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
乳癌(術前)							
◆ DTX+q3wハーセプチン療法(術前)(乳癌)			1コース 21日	■術前:4コース	□術後:	□進行再発:	□その他:
【静注】 ドセタキセル注射液		75 mg/m ²	day 1				
【静注】 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用		6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
◆ pembrolizumab+AC療法(術前)再発高リスクのトリプルネガティブ乳癌)			1コース 21日	■術前:4コース	□術後:	□進行再発:	□その他:
【静注】 シクロホスファミド水和物注射用		600 mg/m ²	day 1				
【静注】 ドキソルビシン塩酸塩注射用		60 mg/m ²	day 1				
【静注】 ベムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液		200 mg/body	day 1				
◆ PTX+CBDDCA(1週毎)+pembro(再発高リスクのトリプルネガティブ乳癌)			1コース 21日	■術前:4コース	□術後:	□進行再発:	□その他:
【静注】 カルボラチナン注射液		AUC 1.5	day 1,8,15				
【静注】 バクリタキセル注射液		80 mg/m ²	day 1,8,15				
【静注】 ベムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液		200 mg/body	day 1				
◆ PTX+CBDDCA(3週毎)+pembro(再発高リスクのトリプルネガティブ乳癌)			1コース 21日	■術前:4コース	□術後:	□進行再発:	□その他:
【静注】 カルボラチナン注射液		AUC 5	day 1				
【静注】 バクリタキセル注射液		80 mg/m ²	day 1,8,15				
【静注】 ベムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液		200 mg/body	day 1				
◆ PTX+q3wハーセプチン療法(術前)(乳癌)			1コース 21日	■術前:4コース	□術後:	□進行再発:	□その他:
【静注】 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用		6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
【静注】 バクリタキセル注射液		80 mg/m ²	day 1,8,15				
乳癌(進行・再発)							
◆ AC療法NK1あり(進行・再発)(乳癌)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】 シクロホスファミド水和物注射用		600 mg/m ²	day 1				
【静注】 ドキソルビシン塩酸塩注射用		60 mg/m ²	day 1				
◆ DTX療法(進行・再発)			1コース 21-28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】 ドセタキセル注射液		75 mg/m ²	day 1				
◆ GEM+CBDDCA+pembrolizumab(進行再発トリプルネガティブ乳癌)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】 カルボラチナン注射液		AUC 2	day 1,8				

【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1000 mg/m ²	day 1,8			
【静注】	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1			
◆	PTX+アバスチン療法(進行・再発)(乳癌)		1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	パクリタキセル注射液	80 mg/m ²	day 1,8,15			
【静注】	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	10 mg/kg	day 1,15			
◆	weekly GT療法(進行・再発)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1000 mg/m ²	day 1,8			
【静注】	パクリタキセル注射液	80 mg/m ²	day 1,8			
◆	weekly PTX療法(進行・再発)		1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	パクリタキセル注射液	80 mg/m ²	day 1,8,15			
◆	アブラキサン療法(進行・再発)(乳癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)注射用	260 mg/m ²	day 1			
◆	イリノテカン療法(進行・再発)		1コース 42日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	イリノテカン塩酸塩水和物注射液	100 mg/m ²	day 1,8,15,22			
◆	エンハーツ(HER2低発現乳癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)注射用	5.4 mg/kg	day 1			
◆	カルボプラチナ+タキソール療法(乳癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	カルボプラチナ注射液	AUC 6	day 1			
【静注】	パクリタキセル注射液	175 mg/m ²	day 1			
◆	ジエムザール療法(進行・再発)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1250 mg/m ²	day 1,8			
◆	テセントリク+アブラキサン療法(乳癌)		1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注射液	840 mg/body	day 1,15			
【静注】	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)注射用	100 mg/m ²	day 1,8,15			
◆	トロデルビ(トリプルネガティブ乳癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	サシズスマブゴビテカン(遺伝子組換え)注射用	10 mg/kg	day 1,8			
◆	ナベルビン療法(進行・再発)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ビノレルビン酒石酸塩注射液	25 mg/m ²	day 1,8			
◆	ハラヴエン療法(進行・再発)(乳癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	エリプリンメシル酸塩注射液	1.4 mg/m ²	day 1,8			
乳癌(進行・再発)q3wハーセプチ						
◆	DTX+q3wハーセプチ療法(進行・再発)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ドセタキセル注射液	75 mg/m ²	day 1			
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量 : 8mg/kg、維持量 : 6mg/kg		
◆	GT+q3wハーセプチ療法(進行・再発)(乳癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1000 mg/m ²	day 1,8			
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量 : 8mg/kg、維持量 : 6mg/kg		
【静注】	パクリタキセル注射液	80 mg/m ²	day 1,8			
◆	HER+PER+AI(HER2+HR陽性乳癌)		1コース 21日	□術前:	■術後:14コース	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1			
【静注】	ペルソスマブ(遺伝子組換え)注射液	420-840 mg/body	day 1			
【内服】	アロマターゼ阻害薬	※ mg/body	day 1-21	※添付文書通り		
◆	HER+PER+AI(HER2陽性HR陽性進行再発乳癌)		1コース 21日	□術前:		■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量 : 8mg/kg、維持量 : 6mg/kg		
【静注】	ペルソスマブ(遺伝子組換え)注射液	420-840 mg/body	day 1	初回量 : 840mg/body、維持量 : 420mg/body		
【内服】	アロマターゼ阻害薬	※ mg/body	day 1-21	※添付文書通り		
◆	PTX+q4wハーセプチ療法(進行・再発乳癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:PDまで □その他:
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量 : 8mg/kg、維持量 : 6mg/kg		
【静注】	パクリタキセル注射液	80 mg/m ²	day 1,8,15			
◆	q3wハーセプチ+TS-1療法(進行・再発)(乳癌)		1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1,22	初回量 : 8mg/kg、維持量 : 6mg/kg		
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80-120 mg/body	day 1タ-29朝	<1.25m ² : 80mg/日 分2、1.25-1.5m ² : 100mg/日 分2、1.5m ² ≤ : 120mg/日 分2		
◆	q3wハーセプチ+アリミテックス療法(進行・再発)(乳癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量 : 8mg/kg、維持量 : 6mg/kg		
【内服】	アナストロゾール	1 mg/body	day 1-21	分1		
◆	q3wハーセプチ+アロマシン療法(進行・再発)(乳癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量 : 8mg/kg、維持量 : 6mg/kg		
【内服】	エキセメスタン	25 mg/body	day 1-21	分1		
◆	q3wハーセプチ+ノルバデックス(進行・再発)(乳癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量 : 8mg/kg、維持量 : 6mg/kg		
【内服】	タモキシフェンクエン酸塩	20 mg/body	day 1-21	分1		
◆	q3wハーセプチ+フルマーラ療法(進行・再発)(乳癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量 : 8mg/kg、維持量 : 6mg/kg		

【内服】	レトロゾール	2.5 mg/body	day 1-21	分1			
◆	q3wハーセブチン療法(進行・再発)(乳癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:			
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
◆	wPTX+バージェタ+q3wHER(HER2陽性進行再発乳癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:			
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
【静注】	パクリタキセル注射液	80 mg/m ²	day 1,8,15				
【静注】	ペルツズマブ(遺伝子組換え)注射液	420-840 mg/body	day 1	初回量: 840mg/body、維持量: 420mg/body			
◆	Xeloda(B)+q3wハーセブチン療法(進行・再発)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:			
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
【内服】	カペシタピン	2500 mg/m ²	day 1タ-15朝	分2			
◆	イリノテカン+q3wハーセブチン療法(進行・再発)(乳癌)		1コース 42日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:			
【静注】	イリノテカン塩酸塩水和物注射液	100 mg/m ²	day 1,8,15,22				
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1,22	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
◆	エンハーツ(進行・再発)乳癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:			
【静注】	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)注射用	5.4 mg/kg	day 1				
◆	カドサイラ(進行・再発乳癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:PDまで □その他:			
【静注】	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)注射用	3.6 mg/kg	day 1				
◆	ジエムザール+q3wハーセブチン療法(進行・再発)(乳癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:			
【静注】	ゲムシタピン塩酸塩注射用	1250 mg/m ²	day 1,8				
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
◆	ドセタキセル+バージェタ+q3wHER(進行再発乳癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:PDまで □その他:			
【静注】	ドセタキセル注射液	75 mg/m ²	day 1				
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
【静注】	ペルツズマブ(遺伝子組換え)注射液	420-840 mg/body	day 1	初回量: 840mg/body、維持量: 420mg/body			
◆	ナベルビン+HER+PER(進行再発乳癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:			
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
【静注】	ビノレルビン酒石酸塩注射液	25 mg/m ²	day 1,8				
【静注】	ペルツズマブ(遺伝子組換え)注射液	420-840 mg/body	day 1	初回量: 840mg/body、維持量: 420mg/body			
◆	ナベルビン+q3wハーセブチン療法(進行・再発)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:			
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
【静注】	ビノレルビン酒石酸塩注射液	25 mg/m ²	day 1,8				
◆	バージェタ+q3wHER(進行再発乳癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:PDまで □その他:			
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
【静注】	ペルツズマブ(遺伝子組換え)注射液	420-840 mg/body	day 1	初回量: 840mg/body、維持量: 420mg/body			
◆	バージェタ+q3wHER+バラガン療法(進行再発乳癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:			
【静注】	エリプリンメシル酸塩注射液	1.4 mg/m ²	day 1,8				
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
【静注】	ペルツズマブ(遺伝子組換え)注射液	420-840 mg/body	day 1	初回量: 840mg/body、維持量: 420mg/body			
◆	バラガン+q3wハーセブチン(HER2陽性進行再発乳癌)		1コース 21日	□術前: □術後: ■進行再発:主治医判断 □その他:			
【静注】	エリプリンメシル酸塩注射液	1.4 mg/m ²	day 1,8				
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			