

癌種	剤型	レジメン名/薬剤	投与量	投与日/1コース日数	備考			
MSI-High 固形癌								
◆ 【静注】	キイトルーダ6週毎(MSI-High 固形癌)			1コース 42日 day 1	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body						
◆ 【静注】	キイトルーダ療法(MSI-High 固形癌)			1コース 21日 day 1	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body						
TMB-High 固形癌								
◆ 【静注】	キイトルーダ 3週ごと(化学療法後増悪TMB-High 固形癌)			1コース 21日 day 1	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body						
◆ 【静注】	キイトルーダ 6週ごと(化学療法後増悪TMB-High 固形癌)			1コース 42日 day 1	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body						
悪性神経膠腫								
◆ 【静注】	ACNU維持治療(悪性神経膠腫)			1コース 56日 day 1	口術前:	■術後:主治医判断	■進行再発:主治医判断	□その他:
	ニムスチン塩酸塩注射用	80 mg/m ²						
◆ 【静注】	AVASTIN(維持療法)(悪性神経膠腫)			1コース 14日 day 1	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	10 mg/kg						
◆ 【静注】	AVASTIN+テモダール(悪性神経膠腫)			1コース 28日 day 1,15	■術前:主治医判断	■術後:主治医判断	■進行再発:主治医判断	□その他:
	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	10 mg/kg						
◆ 【内服】	テモソロミド	150-200 mg/m ²		day 2-6	起床時服用			
	PAV(悪性神経膠腫)			1コース 56日	口術前:	■術後:最大8コース	■進行再発:最大8コース	□その他:
◆ 【静注】	ニムスチン塩酸塩注射用	70 mg/m ²		day 1				
	ビンクリスチン硫酸塩注射用	1.4 mg/m ²		day 8,29	Max 2mg/body			
◆ 【内服】	塩酸プロカルバジン	60 mg/m ²		day 8-21	2~3回で分割投与、50mg刻みで端数切捨て			
視神経・視床下部神経膠腫								
◆ 【静注】	カルボ・ビンクリスチン維持療法(視神経・視床下部神経膠腫)			1コース 42日 day 1,8,15,22	口術前:	■術後:8コース	■進行再発:8コース	■その他:8コース
	カルボプラチナ注射液	175 mg/m ²						
◆ 【静注】	ビンクリスチン硫酸塩注射用	1.5 mg/m ²		day 1,8,15	Max 2mg/body			
	カルボ・ビンクリスチン導入療法(視神経・視床下部神経膠腫)			1コース 84日 day 1,8,15,22,43,50,57,64	口術前:	■術後:1コース	■進行再発:1コース	■その他:1コース
◆ 【静注】	カルボプラチナ注射液	175 mg/m ²						
	ビンクリスチン硫酸塩注射用	1.5 mg/m ²		day 1,8,15,22,29,36,43,50,57,64	Max 2mg/body			
脳悪性リンパ腫								
◆ 【静注】	MPV(初発or未照射再発脳悪性リンパ腫)			1コース 21日(初発)、3~4カ月(再発)	口術前:	口術後:	■進行再発:5コース	■その他:5コース
	ビンクリスチン硫酸塩注射用	1.4 mg/m ²		day 1	Max 2mg/body			
◆ 【静注】	ホリナートカルシウム	15 mg/body		day 11-15				
	メトトレキサート注射用	3500 mg/m ²		day 10	※2~5コースはMTX単独4コース			
◆ 【内服】	塩酸プロカルバジン	100 mg/m ²		day 2-8	2~3回で分割投与、50mg刻みで端数切捨て			
	MPV療法(維持)(脳悪性リンパ腫)			1コース 3~4カ月 day 1	口術前:	口術後:	□進行再発:	■その他:5コース
◆ 【静注】	ビンクリスチン硫酸塩注射用	1.4 mg/m ²			Max 2mg/body			
	ホリナートカルシウム	15 mg/body		day 11-15				
◆ 【静注】	メトトレキサート注射用	3500 mg/m ²		day 10				
	塩酸プロカルバジン	100 mg/m ²		day 2-8	2~3回で分割投与、50mg刻みで端数切捨て			
◆ 【静注】	R-MPV(維持)(再発脳悪性リンパ腫)			1コース 3~4カ月 day 1	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	ビンクリスチン硫酸塩注射用	1.4 mg/m ²			Max 2mg/body			
◆ 【静注】	ホリナートカルシウム	15 mg/body		day 11-15				
	メトトレキサート注射用	3500 mg/m ²		day 10				
◆ 【静注】	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	375 mg/m ²		day 9				
	塩酸プロカルバジン	100 mg/m ²		day 2-8	2~3回で分割投与、50mg刻みで端数切捨て			
◆ 【静注】	weekly rituximab(脳悪性リンパ腫)			1コース 56日 day 1,8,15,22,29,36,43,50	口術前:	口術後:	■進行再発:1コース	□その他:
	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	375 mg/m ²						