

## 皮膚科

2025年7月 審査分

癌種	剤型	レジメン名/薬剤	投与量	投与日/1コース日数	備考			
<b>MSI-High 固形癌</b>								
【静注】	◆ キイトルーダ6週毎(MSI-High 固形癌)			1コース 42日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1					
【静注】	◆ キイトルーダ療法(MSI-High 固形癌)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1					
<b>TMB-High 固形癌</b>								
【静注】	◆ キイトルーダ3週ごと(化学療法後増悪TMB-High 固形癌)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1					
【静注】	◆ キイトルーダ6週ごと(化学療法後増悪TMB-High 固形癌)			1コース 42日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1					
<b>メルケル細胞癌</b>								
【静注】	◆ ババンチオ療法(メルケル細胞癌)			1コース 14日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	アベルマブ(遺伝子組換え)注射液	10 mg/kg	day 1					
<b>悪性黒色腫</b>								
【静注】	◆ オブジーボ+ヤーボイ併用療法(悪性黒色腫)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:4コース	□その他:
	イビリムマブ(遺伝子組換え)注射液	3 mg/kg	day 1					
【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	80 mg/body	day 1					
	◆ オブジーボ4週毎(悪性黒色腫)			1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	day 1					
	◆ オブジーボ4週毎(術後)(悪性黒色腫)			1コース 28日	□術前:	■術後:1年間	□進行再発:	□その他:
【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	day 1					
	◆ オブジーボ療法(悪性黒色腫)			1コース 14日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1					
	◆ オブジーボ療法(術後)(悪性黒色腫)			1コース 14日	□術前:	■術後:1年間	□進行再発:	□その他:
【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1					
	◆ キイトルーダ3週毎 術後補助(悪性黒色腫)			1コース 21日	□術前:	■術後:1年間	□進行再発:	□その他:
【静注】	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1					
	◆ キイトルーダ6週毎 術後補助(悪性黒色腫)			1コース 42日	□術前:	■術後:1年間	□進行再発:	□その他:
【静注】	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1					
	◆ キイトルーダ6週毎(悪性黒色腫)			1コース 42日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1					
	◆ キイトルーダ療法(悪性黒色腫)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1					
	◆ ヤーボイ療法(悪性黒色腫)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:4コース	□その他:
【静注】	イビリムマブ(遺伝子組換え)注射液	3 mg/kg	day 1					
<b>上皮系皮膚悪性腫瘍</b>								
【静注】	◆ オブジーボ2週毎(上皮系皮膚悪性腫瘍)			1コース 14日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1					
【静注】	◆ オブジーボ4週毎(上皮系皮膚悪性腫瘍)			1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	day 1					
<b>皮膚リンパ腫</b>								
【静注】	◆ CHOP(菌状息肉腫)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
	シクロホスファミド水和物注射用	750 mg/m <sup>2</sup>	day 1					
【静注】	ドキソルビシン塩酸塩注射用	50 mg/m <sup>2</sup>	day 1					
	ビンクリスチン硫酸塩注射用	1.4 mg/m <sup>2</sup>	day 1	Max 2mg/body				
【内服】	ブレドニゾロン	100 mg/body	day 1-5					
	◆ アドセトリス单剤療法(CD30陽性皮膚T細胞リンパ腫)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)注射用	1.8 mg/kg	day 1					
	◆ アドセトリス单剤療法(未分化大細胞リンパ腫)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:~16コース	□その他:
【静注】	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)注射用	1.8 mg/kg	day 1					
	◆ ボテリジオ1~4コース目(皮膚T細胞リンパ腫)			1コース 7日	□術前:	□術後:	■進行再発:4コース	■その他:4コース
【静注】	モガムリズマブ(遺伝子組換え)注射液	1 mg/kg	day 1					
	◆ ボテリジオ5コース目以降(皮膚T細胞リンパ腫)			1コース 14日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	■その他:主治医判断
【静注】	モガムリズマブ(遺伝子組換え)注射液	1 mg/kg	day 1					