

癌種	剤型	レジメン名/薬剤	投与量	投与日/1コース日数	備考
MSI-High 固形癌					
	◆ 【静注】	キイトルーダ(3週毎)(進行再発結腸直腸癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1	
	◆ 【静注】	キイトルーダ(6週毎)(進行再発結腸直腸癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	1コース 42日 day 1	口術前: 口術後: ■進行再発:主治医判断 口その他:
	◆ 【静注】	キイトルーダ6週毎(MSI-High 固形癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	1コース 42日 day 1	口術前: 口術後: ■進行再発:主治医判断 口その他:
	◆ 【静注】	キイトルーダ療法(MSI-High 固形癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	1コース 21日 day 1	口術前: 口術後: ■進行再発:主治医判断 口その他:
	◆ 【静注】	ニボルマブ・イビリムマブ併用療法(MSI-High 大腸癌) イビリムマブ(遺伝子組換え)注射液	1 mg/kg	1コース 21日 day 1	口術前: 口術後: ■進行再発:4コース 口その他:
	◆ 【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1	
TMB-High 固形癌					
	◆ 【静注】	キイトルーダ3週ごと(化学療法後増悪TMB-High 固形癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	1コース 21日 day 1	口術前: 口術後: ■進行再発:主治医判断 口その他:
	◆ 【静注】	キイトルーダ6週ごと(化学療法後増悪TMB-High 固形癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	1コース 42日 day 1	口術前: 口術後: ■進行再発:主治医判断 口その他:
悪性黒色腫					
	◆ 【静注】	オブジーボ4週毎(術後)(悪性黒色腫) ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	1コース 28日 day 1	口術前: ■術後:1年間 口進行再発: 口その他:
	◆ 【静注】	オブジーボ療法(術後)(悪性黒色腫) ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	1コース 14日 day 1	口術前: ■術後:1年間 口進行再発: 口その他:
胃癌					
	◆ 【静注】	abraxane+サイラムザ療法(胃癌) パクリタキセル(アルブチン懸濁型)注射用	100 mg/m ²	1コース 28日 day 1,8,15	口術前: 口術後: ■進行再発:主治医判断 口その他:
	【静注】	ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液	8 mg/kg	day 1,15	
	◆ 【静注】	CPT-11療法(B法)(進行・再発胃癌) イリノテカン塩酸塩水和物注射液	150 mg/m ²	1コース 35日 day 1,15	口術前: 口術後: ■進行再発:主治医判断 口その他:
	◆ 【静注】	DOS療法(術前)(胃癌) オキサリプラチニン注射液	100 mg/m ²	1コース 21日 day 1	■術前:3コース 口術後: 口進行再発: 口その他:
	【静注】	ドセタキセル注射液	40 mg/m ²	day 1	
	【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80-120 mg/body	day 1タ-15朝	<1.25m ² : 80mg/日 分2、1.25-1.5m ² : 100mg/日 分2、1.5m ² ≤ : 120mg/日 分2
	◆ 【静注】	FOLFOX+Nivo(HER2陰性胃癌) オキサリプラチニン注射液	85 mg/m ²	1コース 14日 day 1	口術前: 口術後: ■進行再発:主治医判断 口その他:
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1	
	【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m ²	day 1-3	46時間投与
	【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m ²	day 1	
	◆ 【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m ²	day 1	
	◆ 【静注】	FOLFOX+Tmab(HER2強陽性胃癌) オキサリプラチニン注射液	85 mg/m ²	1コース 21日 day 1	口術前: 口術後: ■進行再発:主治医判断 口その他:
	【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量 : 8mg/kg、維持量 : 6mg/kg
	【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m ²	day 1-3	46時間投与
	【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m ²	day 1	
	【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m ²	day 1	
	◆ 【静注】	mFOLFOX6(胃癌) オキサリプラチニン注射液	85 mg/m ²	1コース 14日 day 1	口術前: 口術後: ■進行再発:主治医判断 口その他:
	【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m ²	day 1-3	46時間投与
	【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m ²	day 1	
	【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m ²	day 1	
	◆ 【静注】	Pembro+Tmab+SOX(HER2強陽性胃癌) オキサリプラチニン注射液	130 mg/m ²	1コース 21日 day 1	口術前: 口術後: ■進行再発:主治医判断 口その他:
	【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回 : 8mg/kg、2回目以降 : 6mg/kg
	【静注】	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1	
	【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80-120 mg/body	day 1タ-15朝	<1.25m ² : 80mg/日 分2、1.25-1.5m ² : 100mg/日 分2、1.5m ² ≤ : 120mg/日 分2
	◆ 【静注】	Pembro+Tmab+XELOX(HER2強陽性胃癌) オキサリプラチニン注射液	130 mg/m ²	1コース 21日 day 1	口術前: 口術後: ■進行再発:主治医判断 口その他:
	【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回 : 8mg/kg、2回目以降 : 6mg/kg
	【静注】	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1	
	【内服】	カベシタビン	2400-4200 mg/body	day 1タ-15朝	<1.36m ² : 2400mg/日 分2、1.36-1.66m ² : 3000mg/日 分2、1.66-1.96m ² : 3600mg/日 分2、1.96m ² ≤ : 4200mg/日 分2

◆	PTX+サイラムザ(胃癌)			1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	パクリタキセル注射液		80 mg/m ²	day 1,8,15				
【静注】	ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液		8 mg/kg	day 1,15				
◆	S-1/CDDP(SH)(胃癌)			1コース 35日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	シスプラチン注射液		60 mg/m ²	day 8				
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80-120 mg/body		day 1-21	<1.25 m ² : 80mg/日 、 1.25-1.5 m ² : 100mg/日、 1.5 m ² ≤ : 120mg/日			
◆	S-1+DTX療法(術後)(胃癌)			1コース 21日	□術前:	■術後:6コース	□進行再発:	□その他:
【静注】	ドセタキセル注射液		40 mg/m ²	day 1				
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80-120 mg/body		day 1-15朝	<1.25 m ² : 80mg/日 分2、 1.25-1.5 m ² : 100mg/日 分2、 1.5 m ² ≤ : 120mg/日 分2			
◆	S-1+DTX療法(進行・再発胃癌)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	ドセタキセル注射液		40 mg/m ²	day 1				
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80-120 mg/body		day 1-15朝	<1.25 m ² : 80mg/日 分2、 1.25-1.5 m ² : 100mg/日 分2、 1.5 m ² ≤ : 120mg/日 分2			
◆	S-1+ハーセプチ(HER2強陽性胃癌)			1コース 42日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用		6-8 mg/kg	day 1,22	初回量 : 8mg/kg、維持量 : 6mg/kg			
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80-120 mg/body		day 1-29朝	<1.25 m ² : 80mg/日 分2、 1.25-1.5 m ² : 100mg/日 分2、 1.5 m ² ≤ : 120mg/日 分2			
◆	SOX(術前)(胃癌)			1コース 21日	■術前:3コース	□術後:	□進行再発:	□その他:
【静注】	オキサリプラチン注射液		130 mg/m ²	day 1				
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80-120 mg/body		day 1-15朝	<1.25 m ² : 80mg/日 分2、 1.25-1.5 m ² : 100mg/日 分2、 1.5 m ² ≤ : 120mg/日 分2			
◆	SOX+Nivo(HER2陰性胃癌)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	オキサリプラチン注射液		130 mg/m ²	day 1				
【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液		360 mg/body	day 1				
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤		80 mg/m ²	day 1-15朝	分2			
◆	SOX+Pembro(HER2陰性胃癌)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	オキサリプラチン注射液		130 mg/m ²	day 1				
【静注】	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液		200 mg/body	day 1				
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80-120 mg/body		day 1-15朝	<1.25 m ² : 80mg/日 分2、 1.25-1.5 m ² : 100mg/日 分2、 1.5 m ² ≤ : 120mg/日 分2			
◆	SOX+ハーセプチ(HER2強陽性胃癌)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	オキサリプラチン注射液		130 mg/m ²	day 1				
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用		6-8 mg/kg	day 1	初回量 : 8mg/kg、維持量 : 6mg/kg			
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80-120 mg/body		day 1-15朝	<1.25 m ² : 80mg/日 分2、 1.25-1.5 m ² : 100mg/日 分2、 1.5 m ² ≤ : 120mg/日 分2			
◆	SOX療法(胃癌)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	オキサリプラチン注射液		130 mg/m ²	day 1				
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80-120 mg/body		day 1-15朝	<1.25 m ² : 80mg/日 分2、 1.25-1.5 m ² : 100mg/日 分2、 1.5 m ² ≤ : 120mg/日 分2			
◆	weekly abraxane(胃癌)			1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)注射用		100 mg/m ²	day 1,8,15				
◆	weekly PTX療法(進行・再発胃癌)			1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	パクリタキセル注射液		80 mg/m ²	day 1,8,15				
◆	XELOX+Nivo(HER2陰性胃癌)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	オキサリプラチン注射液		130 mg/m ²	day 1				
【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液		360 mg/body	day 1				
【内服】	カペシタピン		2000 mg/m ²	day 1-15朝	分2			
◆	XELOX+Pembro(HER2陰性胃癌)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	オキサリプラチン注射液		130 mg/m ²	day 1				
【静注】	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液		200 mg/body	day 1				
【内服】	カペシタピン	2400-4200 mg/body		day 1-15朝	<1.36 m ² : 2400mg/日 分2、 1.36-1.66 m ² : 3000mg/日 分2、 1.66-1.96 m ² : 3600mg/日 分2、 1.96 m ² ≤ : 4200mg/日 分2			
◆	XELOX療法(胃癌)			1コース 21日	□術前:	■術後:8コース	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	オキサリプラチン注射液		130 mg/m ²	day 1				
【内服】	カペシタピン	2000 mg/m ²		day 1-15朝	分2			
◆	XP+ハーセプチ(7コース目以降)(HER2発現胃癌)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用		6-8 mg/kg	day 1	初回量 : 8mg/kg、維持量 : 6mg/kg			
【内服】	カペシタピン	2000 mg/m ²		day 1-15朝	分2			
◆	Zolbetuximab+mFOLFOX6(CLDN18.2陽性胃癌)			1コース 14日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	オキサリプラチン注射液		85 mg/m ²	day 1				
【静注】	ゾルベキシマブ(遺伝子組換え)注射用		400-800 mg/m ²	day 1	初回 : 800 mg/m ² 、2回目以降 : 400 mg/m ²			
【静注】	フルオロウラシル注射液		2400 mg/3	day 1-3	46時間投与			
【静注】	フルオロウラシル注射液		400 mg/m ²	day 1				
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用		200 mg/m ²	day 1				
◆	Zolbetuximab+XELOX(CLDN18.2陽性胃癌)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	オキサリプラチン注射液		130 mg/m ²	day 1				
【静注】	ゾルベキシマブ(遺伝子組換え)注射用		600-800 mg/m ²	day 1	初回 : 800 mg/m ² 、2回目以降 : 600 mg/m ²			
【内服】	カペシタピン	2400-4200 mg/body		day 1-15朝	<1.36 m ² : 2400mg/日 分2、 1.36-1.66 m ² : 3000mg/日 分2、 1.66-1.96 m ² : 3600mg/日 分2、 1.96 m ² ≤ : 4200mg/日 分2			
◆	アブラキサン(胃癌)			1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)注射用		260 mg/m ²	day 1				

◆ エンハーツ(胃癌)	1コース 21日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】 トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)注射用	6.4 mg/kg	day 1			
◆ オブジーボ4週毎(胃癌)	1コース 28日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】 ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	day 1			
◆ オブジーボ療法(胃癌)	1コース 14日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】 ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1			
◆ サイラムザ单剤(胃癌)	1コース 28日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】 ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液	8 mg/kg	day 1,15			
◆ ラムシルマブ+イリノテカン療法(胃癌)	1コース 14日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液	150 mg/m ²	day 1			
【静注】 ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液	8 mg/kg	day 1			

小腸癌

◆ mFOLFOX6療法(小腸癌)	1コース 14日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】 オキサリプラチン注射液	85 mg/m ²	day 1			
【静注】 フルオロウラシル注射液	2400 mg/m ²	day 1-3	46時間投与		
【静注】 フルオロウラシル注射液	400 mg/m ²	day 1			
【静注】 レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m ²	day 1			

食道癌

◆ DTX療法(進行・再発食道癌)	1コース 21日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】 ドセタキセル注射液	70 mg/m ²	day 1			
◆ nivolumab療法(食道癌)	1コース 14日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】 ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1			
◆ PTX療法(食道癌)	1コース 56日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】 パクリタキセル注射液	100 mg/m ²	day 1,8,15,22,29,36			
◆ オブジーボ4週毎(食道癌)	1コース 28日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】 ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	day 1			
◆ キイトルーダ3週毎(食道癌)	1コース 21日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】 ベムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1			
◆ キイトルーダ6週毎(食道癌)	1コース 42日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】 ベムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1			
◆ ニボルマブ+イピリムマブ併用療法(ニボルマブ3週毎)(食道癌)	1コース 42日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】 イピリムマブ(遺伝子組換え)注射液	1 mg/kg	day 1			
【静注】 ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	360 mg/body	day 1,22			
◆ 術後補助ニボルマブ療法(2週毎)(食道癌)	1コース 14日	口術前:	■術後:12か月間	口進行再発:	口その他:
【静注】 ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1			
◆ 術後補助ニボルマブ療法(4週毎)(食道癌)	1コース 28日	口術前:	■術後:12か月間	口進行再発:	口その他:
【静注】 ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	day 1			

神経内分泌癌

◆ CPT-11/CDDP(神経内分泌癌)	1コース 28日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液	60 mg/m ²	day 1,8,15			
【静注】 シスプラチニ注射液	60 mg/m ²	day 1			

大腸癌

◆ FOLFIRO(150mg)+Avastin療法(大腸癌)	1コース 14日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液	150 mg/m ²	day 1			
【静注】 フルオロウラシル注射液	2400 mg/m ²	day 1-3	46時間投与		
【静注】 フルオロウラシル注射液	400 mg/m ²	day 1			
【静注】 ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	5 mg/kg	day 1			
【静注】 レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m ²	day 1			
◆ FOLFIRO/セツキシマブ療法(大腸癌)	1コース 14日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液	150 mg/m ²	day 1			
【静注】 セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250-400 mg/m ²	day 1,8	初回量: 400mg/m ² 、維持量: 250mg/m ²		
【静注】 フルオロウラシル注射液	2400 mg/m ²	day 1-3	46時間投与		
【静注】 フルオロウラシル注射液	400 mg/m ²	day 1			
【静注】 レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m ²	day 1			
◆ FOLFIRO+サイラムザ療法(大腸癌)	1コース 14日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液	150 mg/m ²	day 1			
【静注】 フルオロウラシル注射液	2400 mg/m ²	day 1-3	46時間投与		
【静注】 フルオロウラシル注射液	400 mg/m ²	day 1			
【静注】 ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液	8 mg/kg	day 1			
【静注】 レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m ²	day 1			
◆ FOLFIRO+ザルトラップ(大腸癌)	1コース 14日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】 アフリペルセブト ベータ(遺伝子組換え)注射液	4 mg/kg	day 1			
【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液	150 mg/m ²	day 1			

【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m ²	day 1-3	46時間投与		
【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m ²	day 1			
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m ²	day 1			
◆	FOLFIRI+パニツムマブ療法(大腸癌)		1コース 14日	□術前: day 1	□術後: day 1	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	イリノテカン塩酸塩水和物注射液	150 mg/m ²				
【静注】	パニツムマブ(遺伝子組換え)注射液	6 mg/kg				
【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m ²	day 1-3	46時間投与		
【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m ²	day 1			
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m ²	day 1			
◆	FOLFIRI療法(150mg)(大腸癌)		1コース 14日	□術前: day 1	□術後: day 1-3	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	イリノテカン塩酸塩水和物注射液	150 mg/m ²		46時間投与		
【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m ²				
【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m ²				
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m ²	day 1			
◆	FOLFOXIRI+Bev(大腸癌)		1コース 14日	□術前: day 1	□術後: day 1	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	イリノテカン塩酸塩水和物注射液	150 mg/m ²				
【静注】	オキサリプラチニ注射液	85 mg/m ²				
【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m ²	day 1-3	46時間投与		
【静注】	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	5 mg/kg				
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m ²	day 1			
◆	IRIS/Bev療法(大腸癌)		1コース 28日	□術前: day 1,15	□術後: day 1,15	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	イリノテカン塩酸塩水和物注射液	100 mg/m ²				
【静注】	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	5 mg/kg				
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80-120 mg/body	day 1タ-15朝	<1.25m ² : 80mg/日 分2、1.25-1.5m ² : 100mg/日 分2、1.5m ² ≤ : 120mg/日 分2		
◆	IRIS療法(大腸癌)		1コース 28日	□術前: day 1,15	□術後: day 1タ-15朝	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	イリノテカン塩酸塩水和物注射液	100 mg/m ²				
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80 mg/m ²		分2		
◆	mFOLFOX6/セツキシマブ療法(大腸癌)		1コース 14日	□術前: day 1	□術後: day 1-3	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	オキサリプラチニ注射液	85 mg/m ²				
【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250-400 mg/m ²		初回量 : 400mg/m ² 、維持量 : 250mg/m ²		
【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m ²	day 1-3	46時間投与		
【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m ²				
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m ²	day 1			
◆	mFOLFOX6+Avastin療法(大腸癌)		1コース 14日	□術前: day 1	□術後: day 1-3	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	オキサリプラチニ注射液	85 mg/m ²				
【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m ²	day 1-3	46時間投与		
【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m ²				
【静注】	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	5 mg/kg				
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m ²	day 1			
◆	mFOLFOX6+パニツムマブ療法(大腸癌)		1コース 14日	□術前: day 1	□術後: day 1-3	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	オキサリプラチニ注射液	85 mg/m ²				
【静注】	パニツムマブ(遺伝子組換え)注射液	6 mg/kg				
【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m ²	day 1-3	46時間投与		
【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m ²				
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m ²	day 1			
◆	mFOLFOX6療法(大腸癌)		1コース 14日	□術前: day 1	□術後: day 1-3	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	オキサリプラチニ注射液	85 mg/m ²				
【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m ²		46時間投与		
【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m ²				
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m ²	day 1			
◆	mFOLFOX6療法(大腸癌)(術後)		1コース 14日	□術前: day 1	■術後:12コース	□進行再発: □その他:
【静注】	オキサリプラチニ注射液	85 mg/m ²				
【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m ²	day 1-3	46時間投与		
【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m ²				
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m ²	day 1			
◆	sLV5FU2+Bev療法(結腸・直腸癌)		1コース 14日	□術前: day 1-3	□術後: day 1	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m ²		46時間投与		
【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m ²				
【静注】	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	5 mg/kg				
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m ²	day 1			
◆	sLV5FU2+Panj療法(大腸癌)		1コース 14日	□術前: day 1	□術後: day 1-3	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	パニツムマブ(遺伝子組換え)注射液	6 mg/kg				
【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m ²		46時間投与		

【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m ²	day 1	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m ²	day 1		
◆	sLV5FU2療法(大腸癌)		1コース 14日	□術前: 46時間投与	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m ²	day 1-3		
【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m ²	day 1		
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m ²	day 1		
◆	SOX/Bev(大腸癌)		1コース 21日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	オキサリプラチニン注射液	130 mg/m ²	day 1		
【静注】	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	7.5 mg/kg	day 1		
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80-120 mg/body	day 1タ-15朝	<1.25m ² : 80mg/日 分2、1.25-1.5m ² : 100mg/日 分2、1.5m ² ≤: 120mg/日 分2	
◆	SOX療法(大腸癌)		1コース 21日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	オキサリプラチニン注射液	130 mg/m ²	day 1		
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80-120 mg/body	day 1タ-15朝	分2	
◆	Xeloda+Avastin療法(大腸癌)		1コース 21日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	7.5 mg/kg	day 1		
【内服】	カペシタピン	2000 mg/m ²	day 1タ-15朝	分2	
◆	XELOX+Avastin療法(大腸癌)		1コース 21日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	オキサリプラチニン注射液	130 mg/m ²	day 1		
【静注】	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	7.5 mg/kg	day 1		
【内服】	カペシタピン	2000 mg/m ²	day 1タ-15朝	分2	
◆	XELOX療法(大腸癌)		1コース 21日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	オキサリプラチニン注射液	130 mg/m ²	day 1		
【内服】	カペシタピン	2000 mg/m ²	day 1タ-15朝	分2	
◆	XELOX療法(大腸癌)(術後)		1コース 21日	□術前: ■術後:8コース	□進行再発: □その他:
【静注】	オキサリプラチニン注射液	130 mg/m ²	day 1		
【内服】	カペシタピン	2000 mg/m ²	day 1-14		
◆	セツキシマブ(エンコラフェニブ+ビニメチニブ併用)(BRAF陽性大腸癌)		1コース 7日	□術前: □術後: 初回量: 400mg/m ² 、維持量: 250mg/m ²	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250-400 mg/m ²	day 1		
【内服】	エンコラフェニブ	300 mg/body	day 1-7	分1	
【内服】	ビニメチニブ	90 mg/body	day 1-7	分2	
◆	セツキシマブ/イリノテカン(100mg/m ²)併用療法		1コース 42日	□術前: □術後:	■進行再発:PDまで □その他:
【静注】	イリノテカン塩酸塩水和物注射液	100 mg/m ²	day 1,8,15,22		
【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250-400 mg/m ²	day 1,8,15,22,29,36	初回量: 400mg/m ² 、維持量: 250mg/m ²	
◆	セツキシマブ/イリノテカン(150mg/m ²)併用療法		1コース 49日	□術前: □術後:	■進行再発:PDまで □その他:
【静注】	イリノテカン塩酸塩水和物注射液	150 mg/m ²	day 1,15,29		
【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250-400 mg/m ²	day 1,8,15,22,29,36,43	初回量: 400mg/m ² 、維持量: 250mg/m ²	
◆	セツキシマブ+イリノテカン(biweekly)療法(大腸癌)		1コース 14日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	イリノテカン塩酸塩水和物注射液	150 mg/m ²	day 1		
【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	500 mg/m ²	day 1		
◆	セツキシマブ単剤療法(大腸癌)		1コース 7日	□術前: □術後:	■進行再発:PDまで □その他:
【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250-400 mg/m ²	day 1	初回量: 400mg/m ² 、維持量: 250mg/m ²	
◆	バニツムマブ療法(大腸癌)		1コース 14日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	バニツムマブ(遺伝子組換え)注射液	6 mg/kg	day 1		
◆	ペルツズマブ+トラスツズマブ(HER2陽性切除不能進行再発大腸癌)		1コース 21日	□術前: □術後: 初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1		
【静注】	ペルツズマブ(遺伝子組換え)注射液	420-840 mg/body	day 1	初回量: 840mg/body、維持量: 420mg/body	
◆	ロンサーフ+アバストチン療法(大腸癌)		1コース 28日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	5 mg/kg	day 1,15		
【内服】	トリフルリジン・チビラシル塩酸塩配合剤	70 mg/m ²	day 1タ-6朝,8タ-13朝	分2	
◆	隔週投与セツキシマブ(エンコラフェニブ+ビニメチニブ併用)(BRAF陽性大腸癌)		1コース 14日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	500 mg/m ²	day 1		
【内服】	エンコラフェニブ	300 mg/body	day 1-14	分1	
【内服】	ビニメチニブ	90 mg/body	day 1-14	分2	
胆道癌					
◆	GEM+CDDP+Pembro(胆道癌)		1コース 21日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ゲムシタピン塩酸塩注射用	1000 mg/m ²	day 1,8		
【静注】	シスプラチニン注射液	25 mg/m ²	day 1,8		
【静注】	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1		
◆	GEM+Pembro(胆道癌)		1コース 21日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ゲムシタピン塩酸塩注射用	1000 mg/m ²	day 1,8		
【静注】	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1		
胆道癌・肝臓癌・脾臓癌					
◆	biweekly GEM+TS-1(脾癌)		1コース 28日	□術前: □術後:	■進行再発:PDまで □その他:

【静注】 【内服】	ゲムシタビン塩酸塩注射用 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	1000 mg/m ² 60-100 mg/body	day 1,15 day 1タ-8朝,15タ-22朝	<1.25m ² : 60mg/日 分2、1.25-1.5m ² : 80mg/日 分2、1.5m ² ≤ : 100mg/日 分2	■進行再発:主治医判断 □その他:
◆	Durva+GEM+CDDP(胆道癌)	1000 mg/m ²	1コース 21日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	day 1,8			
【静注】	シスプラチニ注射液	25 mg/m ²	day 1,8		
【静注】	デュルバルマブ(遺伝子組換え)注射液	1500 mg/body	day 1		
◆	Durva維持療法(胆道癌)	1500 mg/m ²	1コース 28日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	デュルバルマブ(遺伝子組換え)注射液	1500 mg/body	day 1		
◆	FOLFIRINOX療法(膵臓癌)	180 mg/m ²	1コース 14日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	イリノテカン塩酸塩水和物注射液	85 mg/m ²	day 1		
【静注】	オキサリプラチニ注射液	2400 mg/m ²	day 1-3	46時間投与	
【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m ²	day 1		
【静注】	フルオロウラシル注射液	200 mg/m ²	day 1		
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	1000 mg/m ²	1コース 14日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1000 mg/m ²	day 1		
【静注】	シスプラチニ注射液	25 mg/m ²	day 1		
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80-120 mg/body	day 1タ-8朝	<1.25m ² : 80mg/日 分2、1.25-1.5m ² : 100mg/日 分2、1.5m ² ≤ : 120mg/日 分2	
◆	GEM+CDDP療法(胆道癌)	1000 mg/m ²	1コース 21日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	85 mg/m ²	day 1,8		
【静注】	シスプラチニ注射液	25 mg/m ²	day 1,8		
◆	GEM+S-1(biweekly)(胆道癌)	1000 mg/m ²	1コース 28日	□術前: □術後:	■進行再発:PDまで □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	day 1,15			
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	60-100 mg/body	day 1タ-8朝,15タ-22朝	<1.25m ² : 60mg/日 分2、1.25-1.5m ² : 80mg/日 分2、1.5m ² ≤ : 100mg/日 分2	
◆	GEM+S-1(胆道癌)	1000 mg/m ²	1コース 21日	□術前: □術後:	■進行再発:PDまで □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	day 1,8			
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	60-100 mg/body	day 1タ-15朝	<1.25m ² : 60mg/日 分2、1.25-1.5m ² : 80mg/日 分2、1.5m ² ≤ : 100mg/日 分2	
◆	GEM+S-1療法(膵臓癌)	1000 mg/m ²	1コース 21日	■術前:PDまで ■術後:PDまで	■進行再発:PDまで □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	day 1,8			
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80-120 mg/body	day 1タ-15朝	<1.25m ² : 80mg/日 分2、1.25-1.5m ² : 100mg/日 分2、1.5m ² ≤ : 120mg/日 分2	
◆	GEMOX療法(膵臓癌)	100 mg/m ²	1コース 14日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	オキサリプラチニ注射液	day 1			
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1000 mg/m ²	day 1		
◆	nab-PTX+GEM(膵臓癌)	1000 mg/m ²	1コース 28日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	day 1,8,15			
【静注】	バクリタキセル(アルブミン懸濁型)注射用	125 mg/m ²	day 1,8,15		
◆	nal-IRI+5-FU/LV療法(膵臓癌)	70 mg/m ²	1コース 14日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	イリノテカン塩酸塩水和物 リボソーム製剤	day 1			
【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m ²	day 1-3	46時間投与	
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m ²	day 1		
◆	WHD療法(転移性肝癌:大腸癌)	1000 mg/m ²	1コース 7日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【動注】	フルオロウラシル注射液	day 1			
◆	ジエムザール療法・1時間レジメン(膵癌・胆道癌)	1000 mg/m ²	1コース 28日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	day 1,8,15			
脾・消化管神経内分泌腫瘍					
◆	ストレプトゾシン(脾・消化管神経内分泌腫瘍)	1000 mg/m ²	1コース 7日	□術前: □術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ストレプトゾシン注射用	day 1	1500mg/m ² まで増量可		