

## 消化器内科

2025年7月 審査分

癌種	剤型	レジメン名/薬剤	投与量	投与日/1コース日数	備考		
<b>MSI-High 固形癌</b>							
胃癌	◆ 【静注】	キイトルーダ6週毎(MSI-High 固形癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	1コース 42日 day 1	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
	◆ 【静注】	キイトルーダ療法(MSI-High 固形癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	1コース 21日 day 1	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
<b>胃癌</b>							
胃癌	◆ 【静注】	abraxane+サイラムザ療法(胃癌) パクリタキセル(アルブミン懸濁型)注射用 ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液	100 mg/m <sup>2</sup> 8 mg/kg	1コース 28日 day 1,8,15 day 1,15	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
	◆ 【静注】	CPT-11+CDDP(胃癌) イリノテカン塩酸塩水和物注射液 シスプラチン注射液	60 mg/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup>	1コース 14日 day 1 day 1	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
胃癌	◆ 【静注】	CPT-11療法(B法)(胃癌) イリノテカン塩酸塩水和物注射液	150 mg/m <sup>2</sup>	1コース 35日 day 1,15	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
	◆ 【静注】	FOLFOX+Tmab(HER2強陽性胃癌) オキサリプラチニ注射液 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用 フルオロウラシル注射液 フルオロウラシル注射液 レボホリナートカルシウム注射用	85 mg/m <sup>2</sup> 6-8 mg/kg 2400 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup>	1コース 21日 day 1 day 1 day 1-3 day 1 day 1	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
胃癌	◆ 【静注】	mFOLFOX6(胃癌) オキサリプラチニ注射液 フルオロウラシル注射液 フルオロウラシル注射液 レボホリナートカルシウム注射用	85 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup>	1コース 14日 day 1 day 1-3 day 1 day 1	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
	◆ 【静注】	Pembro+Tmab+SOX(HER2強陽性胃癌) オキサリプラチニ注射液 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用 ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液 内服 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	130 mg/m <sup>2</sup> 6-8 mg/kg 200 mg/body 80-120 mg/body	1コース 21日 day 1 day 1 day 1 day 1-15朝	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
胃癌	◆ 【静注】	Pembro+Tmab+XELOX(HER2強陽性胃癌) オキサリプラチニ注射液 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用 ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液 内服 カベシタビン	130 mg/m <sup>2</sup> 6-8 mg/kg 200 mg/body 2400-4200 mg/body	1コース 21日 day 1 day 1 day 1 day 1-15朝	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
	◆ 【静注】	PTX+サイラムザ(胃癌) パクリタキセル注射液 ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液	80 mg/m <sup>2</sup> 8 mg/kg	1コース 28日 day 1,8,15 day 1,15	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
胃癌	◆ 【静注】	S-1/CDDP(SH)(胃癌) シスプラチニ注射液 内服 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	60 mg/m <sup>2</sup> 80-120 mg/body	1コース 35日 day 8 day 1-21	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
	◆ 【静注】	S-1+CPT-11療法(胃癌) イリノテカン塩酸塩水和物注射液 内服 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80 mg/m <sup>2</sup> 80 mg/m <sup>2</sup>	1コース 35日 day 1,15 day 1-22朝 分2	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
胃癌	◆ 【静注】	S-1+ハーセプチ(HER2強陽性胃癌) トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用 内服 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	6-8 mg/kg 80-120 mg/body	1コース 42日 day 1,22 day 1-29朝	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
	◆ 【静注】	SOX+Pembro(HER2陰性胃癌) オキサリプラチニ注射液 ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液 内服 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	130 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/body 80-120 mg/body	1コース 21日 day 1 day 1 day 1-15朝	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
胃癌	◆ 【静注】	SOX+ハーセプチ(HER2強陽性胃癌) オキサリプラチニ注射液 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用 内服 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	130 mg/m <sup>2</sup> 6-8 mg/kg 80-120 mg/body	1コース 21日 day 1 day 1 day 1-15朝	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
	◆ 【静注】	SOX療法(胃癌) オキサリプラチニ注射液 内服 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	130 mg/m <sup>2</sup> 80-120 mg/body	1コース 21日 day 1 day 1-15朝	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
胃癌	◆ 【静注】	TS-1+PTX療法(胃癌)		1コース 21日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:

【静注】	パクリタキセル注射液	50 mg/m <sup>2</sup>	day 1,8			
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80 mg/m <sup>2</sup>	day 1タ-15朝	分2		
◆	weekly PTX療法(胃癌)		1コース 28日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
【静注】	パクリタキセル注射液	80 mg/m <sup>2</sup>	day 1,8,15			
◆	XELOX+Pembro(HER2陰性胃癌)		1コース 21日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
【静注】	オキサリプラチニ注射液	130 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
【静注】	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1			
【内服】	カベシタビン	2400-4200 mg/body	day 1タ-15朝	<1.36m <sup>2</sup> : 2400mg/日 分2、1.36-1.66m <sup>2</sup> : 3000mg/日 分2、1.66-1.96m <sup>2</sup> : 3600mg/日 分2、1.96m <sup>2</sup> ≤: 4200mg/日 分2		
◆	XP+ハーセプチニ(7コース目以降)(HER2発現胃癌)		1コース 21日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg		
【内服】	カベシタビン	2000 mg/m <sup>2</sup>	day 1タ-15朝	分2		
◆	Zolbetuximab+mFOLFOX6(CLDN18.2陽性胃癌)		1コース 14日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
【静注】	オキサリプラチニ注射液	85 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
【静注】	ゾルベッキシマブ(遺伝子組換え)注射用	400-800 mg/m <sup>2</sup>	day 1	初回: 800 mg/m <sup>2</sup> 、2回目以降: 400 mg/m <sup>2</sup>		
【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m <sup>2</sup>	day 1-3	46時間投与		
【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
◆	Zolbetuximab+XELOX(CLDN18.2陽性胃癌)		1コース 21日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
【静注】	オキサリプラチニ注射液	130 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
【静注】	ゾルベッキシマブ(遺伝子組換え)注射用	600-800 mg/m <sup>2</sup>	day 1	初回: 800 mg/m <sup>2</sup> 、2回目以降: 600 mg/m <sup>2</sup>		
【内服】	カベシタビン	2400-4200 mg/body	day 1タ-15朝	<1.36m <sup>2</sup> : 2400mg/日 分2、1.36-1.66m <sup>2</sup> : 3000mg/日 分2、1.66-1.96m <sup>2</sup> : 3600mg/日 分2、1.96m <sup>2</sup> ≤: 4200mg/日 分2		
◆	アブラキサン療法(胃癌)		1コース 21日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
【静注】	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)注射用	260 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
◆	エンハーツ(胃癌)		1コース 21日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
【静注】	トラスツズマブ デルクスティカン(遺伝子組換え)注射用	6.4 mg/kg	day 1			
◆	サイラムザ单剤(胃癌)		1コース 28日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
【静注】	ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液	8 mg/kg	day 1,15			
◆	ハーセプチニ単独療法(HER2強発現胃癌)		1コース 21日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg		
肝細胞癌						
◆	ATZ+BEV(肝細胞癌)		1コース 21日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
【静注】	アテソリスマブ(遺伝子組換え)注射液	1200 mg/body	day 1			
【静注】	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	15 mg/kg	day 1			
◆	Nivo+Ipi(1~4コース)(肝細胞癌)		1コース 21日	口術前:	口術後:	■進行再発:4コース 口その他:
【静注】	イピリムマブ(遺伝子組換え)注射液	3 mg/kg	day 1			
【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	80 mg/body	day 1			
◆	Nivo+Ipi(5コース以降)(肝細胞癌)		1コース 28日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	day 1			
◆	デュルバルマブ单剤(肝細胞癌)		1コース 28日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
【静注】	デュルバルマブ(遺伝子組換え)注射液	1500 mg/body	day 1	体重30kg以下の場合は20mg/kg		
◆	トレメリムマブ+デュルバルマブ(肝細胞癌)		1コース 28日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
【静注】	デュルバルマブ(遺伝子組換え)注射液	1500 mg/body	day 1	体重30kg以下の場合は20mg/kg		
【静注】	トレメリムマブ(遺伝子組換え)注射液	300 mg/body	day 1	体重30kg以下の場合は4mg/kg、初回のみ投与		
◆	ラムシルマブ单剤(肝細胞癌)		1コース 14日	口術前:	口術後:	■進行再発:PDまで 口その他:
【静注】	ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液	8 mg/kg	day 1			
結腸・直腸癌						
◆	FOLFIRI+Avastin療法(大腸癌)		1コース 14日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
【静注】	イリノテカン塩酸塩水和物注射液	150 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m <sup>2</sup>	day 1-3	46時間投与		
【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
【静注】	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	5 mg/kg	day 1			
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
◆	FOLFIRI+バニツムマブ療法(大腸癌)		1コース 14日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
【静注】	イリノテカン塩酸塩水和物注射液	150 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
【静注】	バニツムマブ(遺伝子組換え)注射液	6 mg/kg	day 1			
【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m <sup>2</sup>	day 1-3	46時間投与		
【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
◆	FOLFIRI療法(大腸癌)		1コース 14日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断 口その他:
【静注】	イリノテカン塩酸塩水和物注射液	150 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m <sup>2</sup>	day 1-3	46時間投与		
【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m <sup>2</sup>	day 1			

◆	FOLFOXIRI+Bev(大腸癌)			1コース 14日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】	イリノテカン塩酸塩水和物注射液		150 mg/m <sup>2</sup>	day 1				
【静注】	オキサリプラチン注射液		85 mg/m <sup>2</sup>	day 1				
【静注】	フルオロウラシル注射液		2400 mg/m <sup>2</sup>	day 1-3	46時間投与			
【静注】	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液		5 mg/kg	day 1				
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用		200 mg/m <sup>2</sup>	day 1				
◆	mFOLFOX6+Avastin療法(大腸癌)			1コース 14日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】	オキサリプラチン注射液		85 mg/m <sup>2</sup>	day 1				
【静注】	フルオロウラシル注射液		2400 mg/m <sup>2</sup>	day 1-3	46時間投与			
【静注】	フルオロウラシル注射液		400 mg/m <sup>2</sup>	day 1				
【静注】	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液		5 mg/kg	day 1				
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用		200 mg/m <sup>2</sup>	day 1				
◆	mFOLFOX6+バニツムマブ療法(大腸癌)			1コース 14日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】	オキサリプラチン注射液		85 mg/m <sup>2</sup>	day 1				
【静注】	バニツムマブ(遺伝子組換え)注射液		6 mg/kg	day 1				
【静注】	フルオロウラシル注射液		2400 mg/m <sup>2</sup>	day 1-3	46時間投与			
【静注】	フルオロウラシル注射液		400 mg/m <sup>2</sup>	day 1				
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用		200 mg/m <sup>2</sup>	day 1				
◆	mFOLFOX6療法(大腸癌)			1コース 14日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】	オキサリプラチン注射液		85 mg/m <sup>2</sup>	day 1				
【静注】	フルオロウラシル注射液		2400 mg/m <sup>2</sup>	day 1-3	46時間投与			
【静注】	フルオロウラシル注射液		400 mg/m <sup>2</sup>	day 1				
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用		200 mg/m <sup>2</sup>	day 1				
◆	SOX/Bev(大腸癌)			1コース 21日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】	オキサリプラチン注射液		130 mg/m <sup>2</sup>	day 1				
【静注】	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液		7.5 mg/kg	day 1				
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80-120 mg/body		day 1タ-15朝	<1.25m <sup>2</sup> : 80mg/日 分2、1.25-1.5m <sup>2</sup> : 100mg/日 分2、1.5m <sup>2</sup> 以上: 120mg/日 分2			
◆	Xeloda+Avastin療法(大腸癌)			1コース 21日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	7.5 mg/kg	day 1					
【内服】	カペシタピン	2000 mg/m <sup>2</sup>		day 1タ-15朝	分2			
◆	XELOX+Avastin療法(大腸癌)			1コース 21日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】	オキサリプラチン注射液	130 mg/m <sup>2</sup>	day 1					
【静注】	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	7.5 mg/kg	day 1					
【内服】	カペシタピン	2000 mg/m <sup>2</sup>		day 1タ-15朝	分2			
◆	XELOX療法(大腸癌)			1コース 21日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】	オキサリプラチン注射液	130 mg/m <sup>2</sup>	day 1					
【内服】	カペシタピン	2000 mg/m <sup>2</sup>		day 1タ-15朝	分2			
◆	セツキシマブ/イリノテカン(100mg/m <sup>2</sup> )併用療法			1コース 42日	口術前:	口術後:	■進行再発:PDまで	口その他:
【静注】	イリノテカン塩酸塩水和物注射液	100 mg/m <sup>2</sup>		day 1,8,15,22				
【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250-400 mg/m <sup>2</sup>		day 1,8,15,22,29,36	初回量: 400mg/m <sup>2</sup> 、維持量: 250mg/m <sup>2</sup>			
◆	セツキシマブ/イリノテカン(150mg/m <sup>2</sup> )併用療法			1コース 49日	口術前:	口術後:	■進行再発:PDまで	口その他:
【静注】	イリノテカン塩酸塩水和物注射液	150 mg/m <sup>2</sup>		day 1,15,29				
【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250-400 mg/m <sup>2</sup>		day 1,8,15,22,29,36,43	初回量: 400mg/m <sup>2</sup> 、維持量: 250mg/m <sup>2</sup>			
◆	セツキシマブ+イリノテカン(biweekly)療法(大腸癌)			1コース 14日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】	イリノテカン塩酸塩水和物注射液	150 mg/m <sup>2</sup>	day 1					
【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	500 mg/m <sup>2</sup>	day 1					
◆	セツキシマブ単剤療法(大腸癌)			1コース 7日	口術前:	口術後:	■進行再発:PDまで	口その他:
【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250-400 mg/m <sup>2</sup>	day 1		初回量: 400mg/m <sup>2</sup> 、維持量: 250mg/m <sup>2</sup>			
◆	バニツムマブ療法(大腸癌)			1コース 14日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】	バニツムマブ(遺伝子組換え)注射液	6 mg/kg		day 1				
◆	ヘルツズマブ+ラスズスマブ(HER2陽性切除不能進行再発大腸癌)			1コース 21日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】	トラスズスマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg		day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg			
【静注】	ペルツズスマブ(遺伝子組換え)注射液	420-840 mg/body		day 1	初回量: 840mg/body、維持量: 420mg/body			
小腸癌								
◆	mFOLFOX6療法(小腸癌)			1コース 14日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】	オキサリプラチン注射液	85 mg/m <sup>2</sup>		day 1				
【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m <sup>2</sup>		day 1-3	46時間投与			
【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m <sup>2</sup>		day 1				
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m <sup>2</sup>		day 1				
食道癌								
◆	DTX療法(食道癌)			1コース 21日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:
【静注】	ドセタキセル注射液	70 mg/m <sup>2</sup>		day 1				
◆	weekly PTX(食道癌)			1コース 56日	口術前:	口術後:	■進行再発:主治医判断	口その他:

【静注】	パクリタキセル注射液	100 mg/m <sup>2</sup>	day 1,8,15,22,29,36			
◆	ストレプトゾシン(膵・消化管神経内分泌腫瘍)		1コース 7日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ストレプトゾシン注射用	1000 mg/m <sup>2</sup>	day 1	1500mg/m <sup>2</sup> まで增量可		
■	膵臓癌・胆道癌					
◆	Durva+GEM+CDDP(胆道癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1000 mg/m <sup>2</sup>	day 1,8			
【静注】	シスプラチニ注射液	25 mg/m <sup>2</sup>	day 1,8			
【静注】	デュルバルマブ(遺伝子組換え)注射液	1500 mg/body	day 1			
◆	Durva維持療法(胆道癌)		1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	デュルバルマブ(遺伝子組換え)注射液	1500 mg/body	day 1			
◆	FOLFIRINOX療法(膵臓癌)		1コース 14日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	イリノテカンド塩酸塩水和物注射液	180 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
【静注】	オキサリプラチニ注射液	85 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m <sup>2</sup>	day 1-3	46時間投与		
【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
◆	GEM+CDDP+Pembro(胆道癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1000 mg/m <sup>2</sup>	day 1,8			
【静注】	シスプラチニ注射液	25 mg/m <sup>2</sup>	day 1,8			
【静注】	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1			
◆	GEM+CDDP+S-1(胆道癌)		1コース 14日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1000 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
【静注】	シスプラチニ注射液	25 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80-120 mg/body	day 1タ-8朝	<1.25m <sup>2</sup> : 80mg/日 分2、1.25-1.5m <sup>2</sup> : 100mg/日 分2、1.5m <sup>2</sup> ≤ : 120mg/日 分2		
◆	GEM+CDDP療法(胆道癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1000 mg/m <sup>2</sup>	day 1,8			
【静注】	シスプラチニ注射液	25 mg/m <sup>2</sup>	day 1,8			
◆	GEM+Pembro(胆道癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1000 mg/m <sup>2</sup>	day 1,8			
【静注】	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1			
◆	GEM+S-1(biweekly)(胆道癌)		1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:PDまで □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1000 mg/m <sup>2</sup>	day 1,15			
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	60-100 mg/body	day 1タ-8朝,15タ-22朝	<1.25m <sup>2</sup> : 60mg/日 分2、1.25-1.5m <sup>2</sup> : 80mg/日 分2、1.5m <sup>2</sup> ≤ : 100mg/日 分2		
◆	GEM+S-1(GS)(胆道癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1000 mg/m <sup>2</sup>	day 1,8			
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	60-100 mg/body	day 1タ-15朝	<1.25m <sup>2</sup> : 60mg/日 分2、1.25-1.5m <sup>2</sup> : 80mg/日 分2、1.5m <sup>2</sup> ≤ : 100mg/日 分2		
◆	GEM+S-1(膵癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1000 mg/m <sup>2</sup>	day 1,8			
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80-120 mg/body	day 1タ-15朝	<1.25m <sup>2</sup> : 60mg/日 分2、1.25-1.5m <sup>2</sup> : 80mg/日 分2、1.5m <sup>2</sup> ≤ : 100mg/日 分2		
◆	GEM+S-1(肺癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1000 mg/m <sup>2</sup>	day 1,8			
【内服】	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80-120 mg/body	day 1タ-15朝	<1.25m <sup>2</sup> : 60mg/日 分2、1.25-1.5m <sup>2</sup> : 80mg/日 分2、1.5m <sup>2</sup> ≤ : 100mg/日 分2		
◆	GEM+タルセバ療法(膵臓癌)		1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1000 mg/m <sup>2</sup>	day 1,8,15			
【内服】	エルロチニブ塩酸塩	100 mg/body	day 1-28	朝食2時間後		
◆	mFOLFOX6(膵臓癌)		1コース 14日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	オキサリプラチニ注射液	85 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m <sup>2</sup>	day 1-3	46時間投与		
【静注】	フルオロウラシル注射液	400 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
◆	nab-PTX+GEM(膵臓癌)		1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1000 mg/m <sup>2</sup>	day 1,8,15			
【静注】	バクリタキセル(アルブチン懸濁型)注射用	125 mg/m <sup>2</sup>	day 1,8,15			
◆	nal-IRI+5-FU/LV療法(膵臓癌)		1コース 14日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	イリノテカンド塩酸塩水和物 リボソーム製剤	70 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
【静注】	フルオロウラシル注射液	2400 mg/m <sup>2</sup>	day 1-3	46時間投与		
【静注】	レボホリナートカルシウム注射用	200 mg/m <sup>2</sup>	day 1			
◆	ジムザール療法(肺癌・胆道癌)		1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1000 mg/m <sup>2</sup>	day 1,8,15			