

耳鼻咽喉・頭頸部外科

2025年7月 審査分

癌種	剤型	レジメン名/薬剤	投与量	投与日/1コース日数	備考		
MSI-High 固形癌							
	◆ 【静注】	キイトルーダ6週毎(MSI-High 固形癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	1コース 42日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	◆ 【静注】	キイトルーダ療法(MSI-High 固形癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	1コース 21日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
TMB-High 固形癌							
	◆ 【静注】	キイトルーダ 6週ごと(化学療法後増悪TMB-High 固形癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	1コース 42日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
悪性黒色腫							
	◆ 【静注】	オブジーボ・ヤーボイ併用療法(悪性黒色腫) イビリムマブ(遺伝子組換え)注射液	3 mg/kg	1コース 21日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:4コース □その他:
	◆ 【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	80 mg/body	day 1			
	◆ 【静注】	オブジーボ4週毎(悪性黒色腫) ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	1コース 28日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	◆ 【静注】	オブジーボ4週毎(術後)(悪性黒色腫) ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	1コース 28日 day 1	□術前:	■術後:1年間	□進行再発: □その他:
	◆ 【静注】	オブジーボ療法(悪性黒色腫) ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	1コース 14日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	◆ 【静注】	オブジーボ療法(術後)(悪性黒色腫) ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	1コース 14日 day 1	□術前:	■術後:1年間	□進行再発: □その他:
	◆ 【静注】	キイトルーダ6週毎(悪性黒色腫) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	1コース 42日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	◆ 【静注】	キイトルーダ療法(悪性黒色腫) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	1コース 21日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	◆ 【静注】	ヤーボイ療法(悪性黒色腫) イビリムマブ(遺伝子組換え)注射液	3 mg/kg	1コース 21日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:4コース □その他:
唾液腺癌							
	◆ 【静注】	HER+DOC(唾液腺癌) ドセタキセル注射液	70 mg/m ²	1コース 21日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:PDまで □その他:
	◆ 【静注】	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	day 1	初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg		
	◆ 【静注】	HER単剤(唾液腺癌) トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	6-8 mg/kg	1コース 21日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:PDまで □その他:
					初回量: 8mg/kg、維持量: 6mg/kg		
頭頸部癌							
	◆ 【静注】	biweekly Cmab(頭頸部癌) セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	500 mg/m ²	1コース 14日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	◆ 【静注】	Cetuximab+PTX(頭頸部癌) セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250-400 mg/m ² 80 mg/m ²	1コース 7日 day 1 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	◆ 【静注】	初回量: 400mg/m ² 、維持量: 250mg/m ²					
	◆ 【静注】	パクリタキセル注射液					
	◆ 【静注】	Cmab+CBDDCA+5-FU療法(頭頸部癌) カルボプラチン注射液	AUC 5	1コース 21日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:6コース □その他:
	◆ 【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250-400 mg/m ²	day 1,8,15	初回量: 400mg/m ² 、維持量: 250mg/m ²		
	◆ 【静注】	フルオロウラシル注射液	800 mg/m ²	day 1-4			
	◆ 【静注】						
	◆ 【静注】	Cmab+CDDP+5-FU療法(頭頸部癌) シスプラチン注射液	80 mg/m ²	1コース 21日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:6コース □その他:
	◆ 【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250-400 mg/m ²	day 1,8,15	初回量: 400mg/m ² 、維持量: 250mg/m ²		
	◆ 【静注】	フルオロウラシル注射液	800 mg/m ²	day 1-4			
	◆ 【静注】						
	◆ 【静注】	Pembrolizumab(頭頸部癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	1コース 21日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:PDまで ■その他:PDまで
	◆ 【静注】						
	◆ 【静注】	PTX+CBDDCA+Cmab(頭頸部癌) カルボプラチン注射液	AUC 2	1コース 21日 day 1,8	■術前:1-2コース	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	◆ 【静注】	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250-400 mg/m ²	day 1,8,15	初回量: 400mg/m ² 、維持量: 250mg/m ²		
	◆ 【静注】	パクリタキセル注射液	100 mg/m ²	day 1,8			
	◆ 【静注】						
	◆ 【静注】	PTX単独(頭頸部癌) パクリタキセル注射液	100 mg/m ²	1コース 56日 day 1,8,15,22,29,36	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	◆ 【静注】						
	◆ 【静注】	weekly CBDDCA: 化学放射線同時療法(CCRT)(頭頸部癌) カルボプラチン注射液	AUC 2	1コース 7日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:7コース □その他:
	◆ 【静注】						
	◆ 【静注】	weekly Cmab(頭頸部癌) セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	250 mg/m ²	1コース 7日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:PDまで □その他:
	◆ 【静注】						
	◆ 【静注】	オブジーボ4週毎(頭頸部癌)		1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:

	【静注】ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
◆	オブジーボ療法(頭頸部癌)		1コース 14日				
【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1				
◆	キイトルーダ6週毎(頭頸部癌)		1コース 42日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1				
◆	ドセタキセル単剤療法(頭頸部癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	ドセタキセル注射液	60 mg/m ²	day 1				