

整形外科

2025年7月 審査分

癌種	剤型	レジメン名/薬剤	投与量	投与日/1コース日数	備考		
MSI-High 固形癌							
◆ 【静注】	キイトルーダ6週毎(MSI-High 固形癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液		400 mg/body	1コース 42日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	キイトルーダ療法(MSI-High 固形癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液		200 mg/body	1コース 21日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
TMB-High 固形癌							
◆ 【静注】	キイトルーダ 6週ごと(化学療法後増悪TMB-High 固形癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液		400 mg/body	1コース 42日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
骨軟部肉腫							
◆ 【静注】	CPT-11単独療法(骨軟部肉腫) イリノテカン塩酸塩水和物注射液		100 mg/m ²	1コース 21日 day 1,8	□術前:	□術後:	■進行再発:2~5コース □その他:
	アドリアシン単剤療法(骨軟部肉腫) ドキソルビシン塩酸塩注射用		50 mg/m ²	1コース 21日 day 1	□術前:	■術後:主治医判断	■進行再発:主治医判断 □その他:
	テセントリック(胞巣状軟部肉腫) アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注射液		1200 mg/body	1コース 21日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	パクリタキセル療法(血管肉腫) パクリタキセル注射液		100 mg/m ²	1コース 56日 day 1,8,15,22,29,36	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他: