

泌尿器科

2025年7月 審査分

癌種	剤型	レジメン名/薬剤	投与量	投与日/1コース日数	備考		
MSI-High 固形癌							
	◆ 【静注】	キイトルーダ6週毎(MSI-High 固形癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	1コース 42日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	◆ 【静注】	キイトルーダ6週毎+ミトタン(MSI-High副腎癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	1コース 42日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	【内服】	オペプリム	1500-4500 mg/body	day 1-42	分3		
	◆ 【静注】	キイトルーダ療法(MSI-High 固形癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	1コース 21日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	◆ 【静注】	ペムプロリズマブ+ミトタン併用療法(MSI-High副腎癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	1コース 21日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	【内服】	オペプリム	1500-4500 mg/body	day 1-21	分3		
	TMB-High 固形癌						
	◆ 【静注】	キイトルーダ3週ごと(化学療法後増悪TMB-High 固形癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	1コース 21日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	◆ 【静注】	キイトルーダ6週ごと(化学療法後増悪TMB-High 固形癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	1コース 42日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	その他						
	◆ 【静注】	アドリアシン単剤療法(後腹膜肉腫) ドキソリビシン塩酸塩注射用	75 mg/m ²	1コース 21日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	◆ 【静注】	ハラヴェン(後腹膜肉腫) エリプリンメシリ酸塩注射液	1.4 mg/m ²	1コース 21日 day 1,8	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	腎細胞癌						
	◆ 【静注】	アベルマブ、アキシチニブ併用療法(進行性腎細胞癌) アベルマブ(遺伝子組換え)注射液	10 mg/kg	1コース 14日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	【内服】	アキシチニブ	4-20 mg/body	day 1-14	分2		
	◆ 【静注】	イピリュマブ+ニボルマブ療法(腎細胞癌) イピリュマブ(遺伝子組換え)注射液	1 mg/kg	1コース 21日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:4コース □その他:
	【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1			
	◆ 【静注】	オブジーボ4週毎(腎癌) ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	1コース 28日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	◆ 【静注】	キイトルーダ6週毎+アキシチニブ(腎癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	1コース 42日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	【内服】	アキシチニブ	10-20 mg/body	day 1-42	朝夕食後		
	◆ 【静注】	トーリセル療法(腎細胞癌) テムシロリムス注射液	25 mg/body	1コース 7日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	◆ 【静注】	ニボルマブ(2週)+カボザンチニブ(腎癌) ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	1コース 14日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	【内服】	カボザンチニブ	40 mg/body	day 1-14	分1 空腹時		
	◆ 【静注】	ニボルマブ(4週)+カボザンチニブ(腎癌) ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	1コース 28日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	【内服】	カボザンチニブ	40 mg/body	day 1-28	分1 空腹時		
	◆ 【静注】	ニボルマブ(腎癌) ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	1コース 14日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	◆ 【静注】	ペムプロリズマブ+アキシチニブ(腎癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	1コース 21日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	【内服】	アキシチニブ	10-20 mg/body	day 1-21	朝夕食後		
	◆ 【静注】	ペムプロリズマブ術後補助(3週)(腎癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	1コース 21日 day 1	□術前:	■術後:1年間	□進行再発: □その他:
	◆ 【静注】	ペムプロリズマブ術後補助(6週)(腎癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	1コース 42日 day 1	□術前:	■術後:1年間	□進行再発: □その他:
	◆ 【静注】	レンバチニブ+ペムプロリズマブ(腎癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	1コース 21日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	【内服】	レンバチニブ	20 mg/body	day 1-21	分1		
	◆ 【静注】	レンバチニブ+ペムプロリズマブ6週(腎癌) ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	1コース 42日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:
	【内服】	レンバチニブ	20 mg/body	day 1-42	分1		
前立腺癌							
	◆ 【静注】	カバジタキセル療法(前立腺癌) カバジタキセル アセトン付加物注射液	25 mg/m ²	1コース 21日 day 1	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断 □その他:

◆	ドセタキセル+ダロルタミド併用療法(遠隔転移を有する前立腺癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:6コース	□その他:
【静注】	ドセタキセル注射液	75 mg/m ²	day 1				
【内服】	ダロルタミド	1200 mg/body	day 1-21	分2			
◆	ドセタキセル療法(前立腺癌)		1コース 21-28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	ドセタキセル注射液	70 mg/m ²	day 1				
尿路上皮癌							
◆	EV+Pembrolizumab(尿路上皮癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:下記*	□その他:
【静注】	エンホルツマブペドチン(遺伝子組換え)注射用	1.25 mg/kg	day 1,8	MAX 125mg/body	*エンホルツマブペドチン: 主治医判断		
【静注】	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1	*ペムブロリズマブ:35コース			
◆	GC+Nivo(尿路上皮癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:6コース	□その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1000 mg/m ²	day 1,8				
【静注】	シスプラチニン注射液	70 mg/m ²	day 2				
【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	360 mg/body	day 1				
◆	GEM+CDDP(3weeks)(尿路上皮癌)		1コース 21日	■術前:3~6コース	■術後:3~6コース	■進行再発:3~6コース	□その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1000 mg/m ²	day 1,8				
【静注】	シスプラチニン注射液	70 mg/m ²	day 2				
◆	GEM+CDDP(尿路上皮癌)		1コース 28日	■術前:3~6コース	■術後:3~6コース	■進行再発:3~6コース	□その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1000 mg/m ²	day 1,8,15				
【静注】	シスプラチニン注射液	70 mg/m ²	day 2				
◆	アベルマブ化学療法後維持療法(尿路上皮癌)		1コース 14日	□術前:	□術後:	□進行再発:	■その他:主治医判断
【静注】	アベルマブ(遺伝子組換え)注射液	10 mg/kg	day 1				
◆	エンホルツマブペドチン(尿路上皮癌)		1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	エンホルツマブペドチン(遺伝子組換え)注	1.25 mg/kg	day 1,8,15	MAX 125mg/body			
◆	キイトルーダ6週毎(尿路上皮癌)		1コース 42日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	400 mg/body	day 1				
◆	ゲムシタビン(尿路上皮癌)		1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	ゲムシタビン塩酸塩注射用	1000 mg/m ²	day 1,8,15				
◆	ニボルマブ維持療法(尿路上皮癌)		1コース 28日	□術前:	□術後:	■進行再発:2年間	□その他:
【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	day 1				
◆	ニボルマブ術後補助(2週)(尿路上皮癌)		1コース 14日	□術前:	■術後:12か月間	□進行再発:	□その他:
【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240 mg/body	day 1				
◆	ニボルマブ術後補助(4週)(尿路上皮癌)		1コース 28日	□術前:	■術後:12か月間	□進行再発:	□その他:
【静注】	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	480 mg/body	day 1				
◆	ペムブロリズマブ(尿路上皮癌)		1コース 21日	□術前:	□術後:	■進行再発:主治医判断	□その他:
【静注】	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	200 mg/body	day 1				